



## Feuille d'exercices 1

### Logique et raisonnement

#### Eléments de logique

**Exercice 1.** Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont équivalentes ?

1.  $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow R$ .
2.  $P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)$ .
3.  $(P \text{ ET } Q) \Rightarrow R$ .
4.  $(P \Rightarrow R) \text{ ET } (Q \Rightarrow R)$ .

**Exercice 2.** Soient  $P$  et  $Q$  deux assertions. La proposition  $(P \text{ ET } Q) \Rightarrow \text{non}(P) \text{ ET } Q$  est-elle vraie ?

**Exercice 3.** Soient  $P, Q, R$  et  $S$  quatre assertions. Ecrire la négation de  $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow (R \Rightarrow S)$ .

**Exercice 4.** Soient  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue et  $P, Q$  et  $R$  les assertions suivantes :

$$\begin{aligned} P : & \quad \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0, \\ Q : & \quad \exists x \in \mathbb{R}, f(x) = 0, \\ R : & \quad (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0) \text{ OU } (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) < 0). \end{aligned}$$

Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont exactes ?

1.  $P \Rightarrow Q$
2.  $Q \Rightarrow P$
3.  $Q \Rightarrow R$
4.  $\text{non}(R) \Rightarrow Q$
5.  $\text{non}(Q) \Rightarrow \text{non}(P)$
6.  $\text{non}(P) \Rightarrow \text{non}(R)$

**Exercice 5.** Ecrire les propositions suivantes et leurs négations à l'aide de quantificateurs et dire lesquelles sont vraies.

1. Aucun entier n'est supérieur à tous les autres.
2. Il existe un entier multiple de tous les autres.
3. Tout complexe possède au moins une racine carré dans  $\mathbb{C}$ .
4. Tous les réels ne sont pas des quotients d'entiers.
5. Certains réels sont supérieurs à leur carré.
6. Etant donné trois réels, il y en a au moins deux de même signe.

**Exercice 6.** Déterminer toutes les propositions suivantes parmi celle ci-dessous et parmi celles que l'on peut obtenir en permutant l'ordre des quantificateurs.

$$\exists x \in \mathbb{R}^*, \forall y \in \mathbb{R}^*, \forall z \in \mathbb{R}^*, \quad z = xy.$$

**Exercice 7.** Soient  $P, Q$  et  $R$  trois propositions. Démontrer les assertions suivantes.

1.  $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow [(P \text{ ET } R) \Rightarrow (Q \text{ ET } R)]$ .
2.  $P \Rightarrow (\text{non}(P) \Rightarrow Q)$ .
3.  $(P \text{ OU } Q) \Leftrightarrow [(P \Rightarrow Q) \Rightarrow Q]$ .

**Exercice 8.** Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ . Enoncer en français les assertions suivantes et écrire avec des quantificateurs leurs négations.

1.  $\exists C \in \mathbb{R}, \forall x \in I, \quad f(x) = C$ .
2.  $\forall x \in I, \quad f(x) = 0 \Rightarrow x = 0$ .
3.  $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in I, \quad f(x) = y$ .
4.  $\forall (x, y) \in I^2, \quad x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$ .
5.  $\forall x \in I, \quad f(x) > 0 \Rightarrow x \neq 0$ .

**Exercice 9.** Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ . Ecrire avec des quantificateurs les phrases suivantes puis les nier.

1. La fonction  $f$  s'annule sur  $I$ .
2. La fonction  $f$  est la fonction nulle sur  $I$ .
3. La fonction  $f$  ne prend jamais deux fois la même valeur.
4. La fonction  $f$  admet un minimum.
5. La fonction  $f$  prend des valeurs arbitrairement grandes.

**Exercice 10.** Dire si les assertions suivantes sont vraies ou fausses et écrire leurs négations.

1.  $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0$ .
2.  $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y > 0$ .
3.  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0$ .
4.  $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y^2 > x$ .

**Exercice 11.** Dans chacun des cas suivants dire si l'assertion est vraie ou fausse et la nier.

1.  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists N \in \mathbb{N}, n \leq N$ .
2.  $\exists n \in \mathbb{N}, \forall N \in \mathbb{N}, n \leq N$ .
3.  $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y = f(x)$ .
4.  $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y = f(x)$ .

**Exercice 12.** Préciser la validité des énoncés suivants puis les nier.

1.  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, m$  divise  $n$ .
2.  $\exists m \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, m$  divise  $n$ .
3.  $\exists a \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0, |a| \leq \varepsilon$ .
4.  $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in \mathbb{R}, |a| \leq \varepsilon$ .
5.  $\forall M > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, 2^n > M$ .
6.  $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y < x$ .
7.  $\forall x \in \mathbb{R}, (x + 1 \neq 0 \text{ OU } x + 2 \neq 0)$ .



## Méthodes de raisonnements

**Exercice 13.** Soient  $a$  et  $b$  deux réels strictement positifs.

- Démontrer que  $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$ .
- En déduire que  $|\sqrt{a} - \sqrt{b}| \leq \sqrt{|a-b|}$ .

**Exercice 14.** Démontrer que pour tout  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ ,

$$\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2 = 0 \Rightarrow \alpha = \beta = 0.$$

**Exercice 15.** Démontrer que pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ,

$$xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

**Exercice 16.** Démontrer que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad |x + y| = |x| + |y| \Leftrightarrow xy \geq 0.$$

**Exercice 17.** Soient  $a_1, \dots, a_9$  neuf entiers naturels tels que  $a_1 + \dots + a_9 = 90$ . Démontrer qu'il existe trois de ces nombres dont la somme est supérieure ou égale à 30.

**Exercice 18.** Démontrer que  $\frac{\ln(2)}{\ln(3)}$  est irrationnel.

**Exercice 19.** Soit  $x$  un irrationnel positif. Démontrer que  $\sqrt{x}$  est irrationnel.

**Exercice 20.** Montrer qu'il n'existe pas de polynôme  $P$  tel que  $\forall x \in \mathbb{R}, e^x = P(x)$ .

**Exercice 21.** Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Montrer que si  $n^2 - 1$  n'est pas divisible par 8 alors  $n$  est pair.

**Exercice 22.** Montrer que lorsque qu'un réel peut s'écrire de la forme  $a + b\sqrt{2}$  avec  $(a, b) \in \mathbb{Z}$ , alors l'écriture est unique.

**Exercice 23.** Déterminer toutes les fonctions  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  impaires tel que  $f - \text{Id}_{\mathbb{R}}$  soit paire.

**Exercice 24.** Déterminer toutes les applications  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  telles que

$$\forall (n, m) \in \mathbb{N}^2, \quad f(n+m) = f(n) + f(m).$$

**Exercice 25.** Déterminer toutes les applications  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x)f(y) - f(xy) = x + y.$$

**Exercice 26.** Déterminer tous les réels  $x$  strictement positifs vérifiant l'équation  $x^{(x^x)} = (x^x)^x$ .

**Exercice 27.** Soient  $s$  et  $p$  deux réels. Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe deux réels dont la somme vaut  $s$  et le produit vaut  $p$ .

**Exercice 28.** On cherche l'ensemble des isométries de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , c'est-à-dire l'ensemble des fonctions de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  vérifiant

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad |f(y) - f(x)| = |y - x|.$$

1. **Analyse.** On définit l'application  $\delta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  par  $\forall x \in \mathbb{R}, \delta(x) = f(x) - f(0)$ .

(a) Montrer que pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2, \delta(y)\delta(x) = yx$ .

(b) En déduire la forme de  $f$ .

2. **Synthèse.** Conclure.

**Exercice 29.** Soit  $q \in \mathbb{C}$ , démontrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\sum_{k=1}^n q^k = \begin{cases} \frac{1-q^{n+1}}{1-q} & \text{si } q \neq 1, \\ n+1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

**Exercice 30.** Démontrer les formules suivantes :

$$1. \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

$$2. \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

$$3. \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

**Exercice 31.** On considère la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par  $u_0 = 0, u_1 = 1$  et pour tout  $n \geq 0, u_{n+2} = u_{n+1} + 2u_n$ .

1. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}, u_n \in \mathbb{N}$ .

2. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{2^n - (-1)^n}{3}$ .

**Exercice 32.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $u_0 = 1$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ . Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}, u_n \leq 2^n$ .

**Exercice 33.** Démontrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

**Exercice 34.** On considère la suite définie par  $u_0 = 0, u_1 = 0, u_2 = 1$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}, u_{n+3} = 3u_{n+2} - 3u_{n+1} + u_n$ . Démontrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}, u_n = n(n-1)$ .