Réponses de l'interrogation 10

Equations différentielles d'ordre 1.

1. (a) Énoncer le principe de superposition.

Solution. Soient I un intervalle, a , b_1 et b_2 trois fonctions continues sur I , y_1 une solution de

$$(E_1) \quad \forall x \in I, \quad y'(x) + a(x)y(x) = b_1(x)$$

et y_2 une solution de

$$(E_2) \quad \forall x \in I, \quad y'(x) + a(x)y(x) = b_2(x).$$

Alors, $y_1 + y_2$ est une solution de

$$(E) \quad \forall x \in I, \quad y'(x) + a(x)y(x) = b_1(x) + b_2(x)$$

- (b) Définir un problème de Cauchy.

Solution. Soient I un intervalle, a et b deux fonctions continues sur I , $t_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}$ alors le problème suivant d'inconnue y une fonction dérivable sur I est un problème de Cauchy

$$(\mathcal{P}) \quad \begin{cases} \forall t \in I, y'(t) + a(t)y(t) = b(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

- (c) Énoncer la formule de Moivre.

Solution. Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{Z}$, on a

$$(\cos(\theta) + i \sin(\theta))^n = (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

2. Déterminer les intervalles de résolution puis sur l'un d'eux, déterminer $\mathcal{S}_0$ l'ensemble des solutions de l'équation homogène (E_0) associée à (E) : $\ln(t)y(t) + t \ln^4(t) (y'(t) + 1) = 0$ d'inconnue y une fonction dérivable.

Solution. Donc les intervalles de résolution de (E) sont

$$I_1 =]0; 1[\quad \text{et} \quad I_2 =]1; +\infty[.$$

Conclusion,

$$\mathcal{S}_0 = \text{Vect} \left(\begin{array}{c}]1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto e^{\frac{1}{2 \ln^2(t)}} \end{array} \right) = \left\{ \begin{array}{c}]1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto C e^{\frac{1}{2 \ln^2(t)}} \end{array} \mid C \in \mathbb{R} \right\}.$$

3. Justifier que l'équation (E) : $y'(x) - \frac{2x}{1+x^2}y(x) = \arctan(x)$ admet des solutions sur $I = \mathbb{R}$ et les déterminer à l'aide de la méthode de variation de la constante.

On pourra admettre que $y_0 : x \mapsto 1 + x^2$ est une solution de l'équation homogène associée.

Solution. Conclusion, l'ensemble des solutions de (E) est donné par

$$\mathcal{S} = \left\{ \begin{array}{c} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \left(\frac{\arctan^2(x)}{2} + C \right) (1 + x^2) \end{array} \mid C \in \mathbb{R} \right\}.$$

4. Justifier que $f : x \mapsto \frac{2x-3}{x^2-4x+3}$ admet des primitives sur $]3; +\infty[$ et les déterminer.

Solution. Conclusion, l'ensemble des primitives de f est donnée par

$$\mathcal{S} = \left\{ \begin{array}{c}]3; +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \ln \left(\frac{(x^2 - 4x + 3) \sqrt{x-3}}{\sqrt{x-1}} \right) + C \end{array} \mid C \in \mathbb{R} \right\}.$$

5. Justifier que $I = \int_0^1 \frac{\sqrt{t}}{t+1} dt$ existe et calculer I à l'aide d'un changement de variable.

Solution. Conclusion,

$$I = 2 - \frac{\pi}{2}.$$