

Feuille de TD n°2
Calcul différentiel

Exercice 1. Justifier que les deux fonctions suivantes sont différentiables, calculer leurs gradients et en déduire leurs différentielles,

$$f(x, y, z) = 2 + 3z + xy + z \sin(x^2 + y^2), \quad g(x, y) = 1 + x\sqrt{y^2 + 2}.$$

Exercice 2. Calculer la jacobienne des applications suivantes,

$$\begin{aligned} f_1(x, y, z) &= (\sin(xyz), x + e^z, y + z), & f_2(x, y, z) &= (x \operatorname{ch}(y), e^y \cos(z)), \\ f_3(x, y, z) &= e^{xy} (\cos(z) + \sin(y)), & f_4(x, y) &= (x, y e^x, xy^2), \\ f_5(x) &= (e^x, x^3, \cos(x)). \end{aligned}$$

Exercice 3. Soit $f(x, y)$ une fonction de classe \mathcal{C}^2 au voisinage du cercle unité, $x^2 + y^2 = 1$. Pour tout nombre réel θ on pose $F(\theta) = f(\cos \theta, \sin \theta)$. Calculer $F''(0)$ en fonction de $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1, 0)$.

Exercice 4. Soit f une application de \mathbb{R}^2 dans \mathbb{R} , de classe \mathcal{C}^1 . On effectue le changement de variable en coordonnées polaires en définissant

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (r, \theta) &\mapsto f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)). \end{aligned}$$

1. Justifier que g est \mathcal{C}^1 sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ et calculer ses dérivées partielles en fonction de celles de f .
2. Calculer, en inversant une certaine matrice, $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ en fonction de $\frac{\partial g}{\partial r}$ et $\frac{\partial g}{\partial \theta}$.
3. Déterminer toutes les fonctions \mathcal{C}^1 vérifiant

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Exercice 5.

1. Trouver les applications $G : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^2 telles que, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $\frac{\partial^2 G}{\partial x \partial y}(x, y) = 0$.
2. Trouver les applications $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^2 telles que, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x, y) - \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x, y) = 0.$$

Indication : poser $\varphi(u, v) = \frac{1}{2}(u + v, u - v)$ et $G = F \circ \varphi$.

Exercice 6. Soit

$$f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, xy = 1\} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$(x, y) \mapsto \arctan(x) + \arctan(y) - \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right).$$

Justifier que f est \mathcal{C}^1 sur son ensemble de définition et calculer Df . En déduire les valeurs de f .

Exercice 7. Montrer que l'identité des accroissements finis n'est pas vraie pour les fonctions vectorielles en considérant

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$$
$$x \mapsto (\cos(x), \sin(x)).$$

Exercice 8. Écrire le développement de Taylor à l'ordre de 2 au voisinage de $(0, 0)$ de la fonction f définie par $f(x, y) = \frac{e^x}{\cos y}$. En déduire la limite quand (x, y) tend vers $(0, 0)$ de $\frac{e^x - (1+x) \cos y}{(x^2 + y^2) \cos y}$.

Exercice 9. Déterminer les extremums et dire s'ils sont locaux ou globaux des applications suivantes.

1. $f_1(x, y) = x^2 - y^2$.
2. $f_2(x, y) = x^3 - y^3$.
3. $f_3(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.
4. $f_4(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy + 1$.

Exercice 10. Déterminer suivant les valeurs du paramètre λ , la nature des extremums de la fonction

$$f(x, y) = y(x^2 + y^2 - 2\lambda y).$$

Exercice 11. Étudier les extrema de la fonction

$$f(x, y, z) = x^2y + y^2z + 2x - z.$$

Exercice 12. Déterminer le volume maximal d'un parallélépipède rectangle dont la surface fait $2m^2$.

Exercice 13. Déterminer les extremums de la fonction f définie sur $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \leq 0, y \leq 0, x + y \geq -3\}$ par

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - xy + x + y.$$