

Correction de la question 5 de l'exercice 2 de la session 2

On suppose l'étude faite sur $n = 10000$ personnes. En approchant X_n par la question 3 et sachant que pour $N \sim \mathcal{N}(0, 1)$ une gaussienne centrée réduite on a $\mathbb{P}(N \leq 1.64) = 0.95$, déterminer $x_{0.1}$ pour que $\mathbb{P}\left(\left|\frac{X_n}{n} - p\right| > x_{0.1}\right) \leq 0.1$.

Pour reprendre la question 3, on sait que $X_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$ est une somme de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées, de loi une Bernoulli de paramètre p . Donc le théorème central limite nous assure que $\frac{X_n - np}{\sqrt{n}\sqrt{p(1-p)}}$ converge en loi vers une loi normale centrée réduite. On en fera donc l'hypothèse que

$$\frac{X_n - np}{\sqrt{n}\sqrt{p(1-p)}} \simeq N$$

où $N \sim \mathcal{N}(0, 1)$ est une gaussienne de moyenne 0 et de variance 1. En conséquence, on écrit que

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\left|\frac{X_n}{n} - p\right| > x_{0.1}\right) &= \mathbb{P}\left(\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}} \left|\frac{X_n - np}{n}\right| > \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}} x_{0.1}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\frac{|X_n - np|}{\sqrt{n}\sqrt{p(1-p)}} > \frac{\sqrt{n}x_{0.1}}{\sqrt{p(1-p)}}\right) \\ &\simeq \mathbb{P}\left(N > \frac{\sqrt{n}x_{0.1}}{\sqrt{p(1-p)}}\right).\end{aligned}$$

Maintenant, et c'était notre passage délicat, puisque $p(1-p) \leq 1/4$, on sait que $\frac{\sqrt{n}x_{0.1}}{\sqrt{p(1-p)}} \geq 2\sqrt{n}x_{0.1}$.

Donc si $N > \frac{\sqrt{n}x_{0.1}}{\sqrt{p(1-p)}}$ alors $N > 2\sqrt{n}x_{0.1}$ (et c'est dans ce sens et pas un autre), c'est-à-dire que le premier événement implique le second événement qui est, par suite, « plus gros ». Donc la probabilité du premier est plus petite que la probabilité du second :

$$\mathbb{P}\left(N > \frac{\sqrt{n}x_{0.1}}{\sqrt{p(1-p)}}\right) \leq \mathbb{P}(N > 2\sqrt{n}x_{0.1}).$$

On résume, d'une part on a

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{X_n}{n} - p\right| > x_{0.1}\right) \leq \mathbb{P}(N > 2\sqrt{n}x_{0.1}),$$

d'autre part, lorsque $2\sqrt{n}x_{0.1} \geq 1,64$ (ou vous pouvez remplacer les inégalités par des égalités si vous préférez), on a

$$\mathbb{P}(N > 2\sqrt{n}x_{0.1}) \leq \mathbb{P}(N > 1,64) \leq 0,1.$$

Donc lorsque $x_{0.1} \geq \frac{1,64}{2\sqrt{n}} = \frac{1,64}{200} = 0,0082$, on conclut que

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{X_n}{n} - p\right| > 0,0082\right) \leq 0,1.$$