

Activité. Formule du volume d'un parallélépipède par la procédure d'orthonormalisation de Gram-Schmidt

Exercice 1. Soient \vec{u} , \vec{v} et \vec{w} trois vecteurs non-coplanaires de \mathbb{R}^3 . On note par $\mathcal{P} = \{\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} + \gamma\vec{w}, (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3, \alpha + \beta + \gamma = 1\}$ le parallélépipède défini par \vec{u} , \vec{v} et \vec{w} . On cherche à exprimer son volume noté \mathcal{V} en fonction du déterminant. On munit \mathbb{R}^3 de sa structure euclidienne canonique, avec son produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et la norme associée $\|\cdot\|$: si $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ et $\vec{y} = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$, alors

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 \quad \|\vec{x}\| = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}.$$

1. Pour $\lambda_1 \in \mathbb{R}$, on construit $\vec{e}_u = \frac{1}{\lambda_1}\vec{u}$. Trouver λ_1 pour que \vec{e}_u soit de norme 1 : $\|\vec{e}_u\| = 1$, et de même sens que \vec{u} .
2. Pour $(\lambda_2, \lambda_3) \in \mathbb{R}^2$, non nuls, on construit $\vec{e}_v = \frac{1}{\lambda_3}(\vec{v} - \lambda_2\vec{e}_u)$. Trouver λ_2 pour que \vec{e}_v soit orthogonal à \vec{e}_u : $\langle \vec{e}_v, \vec{e}_u \rangle = 0$ puis trouver $\lambda_3 > 0$ pour que \vec{e}_v soit de norme 1.
3. Pour $(\lambda_4, \lambda_5, \lambda_6) \in \mathbb{R}^3$, non nuls, on construit $\vec{e}_w = \frac{1}{\lambda_6}(\vec{w} - \lambda_5\vec{e}_v - \lambda_4\vec{e}_u)$. Trouver λ_4 pour que \vec{e}_w soit orthogonal à \vec{e}_u , puis λ_5 pour que \vec{e}_w soit orthogonal à \vec{e}_v et enfin trouver $\lambda_6 > 0$ pour que \vec{e}_w soit de norme 1.
4. On note $\mathcal{B} = (\vec{e}_u, \vec{e}_v, \vec{e}_w)$. Que dire de cette base ?
5. Donner les coordonnées de \vec{u} , \vec{v} et \vec{w} dans cette base en fonction uniquement de leurs produits scalaires avec \vec{e}_u , \vec{e}_v et \vec{e}_w .
6. Calculer $\det_{\mathcal{B}}(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ et montrer que cela correspond bien au volume \mathcal{V} .
7. Soit $\mathcal{C} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ une base orthonormée, orientée dans le même sens que \mathcal{B} . Ecrire les coordonnées des vecteurs de \mathcal{C} dans la base \mathcal{B} en fonction de leurs produits scalaires. En déduire que $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}) = \det_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})$.
8. Montrer alors que $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}) = 1$.
9. En déduire que $\mathcal{V} = \det_{\mathcal{C}}(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.
10. Montrer que $\langle u \wedge v, w \rangle = \mathcal{V}$.
11. Calculer \mathcal{V} lorsque dans la base canonique de \mathbb{R}^3 on a

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

12. Justifier que lorsque les sommets du parallélépipède sont des points de \mathbb{R}^3 à coordonnées entières alors le volume \mathcal{V} est un entier.