

Colle du 27/03
Dérivabilité et géométrie du plan

Sujet 1

Question de cours. Démontrer le théorème de Rolle et des accroissements finis.

Exercice 1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}} \leq \sqrt{n} - \sqrt{n-1}.$$

Exercice 2. Dans le plan rapporté au repère orthonormé direct $\mathcal{R} = (O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère la courbe \mathcal{C} d'équation

$$x^2 + xy + y^2 + x - y = 0.$$

On note $O'(-1; 1)_{\mathcal{R}}$. Soient \vec{I} le vecteur de norme 1 tel que $(\vec{i}, \vec{I}) = \frac{\pi}{4}$ et \vec{J} le vecteur tel que (\vec{I}, \vec{J}) soit orthonormée. On définit alors \mathcal{R}' le repère $(O'; \vec{I}, \vec{J})$.

1. Soit $M(X; Y)_{\mathcal{R}'}$ un point du plan. Exprimer les coordonnées de M dans le repère \mathcal{R} .
2. En déduire l'équation de \mathcal{C} dans \mathcal{R}' .

Sujet 2

Question de cours. Soit f une fonction dérivable. Montrer que f est croissante si et seulement si $f' \geq 0$.

Exercice 1. Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$, une fonction de classe \mathcal{C}^2 telle que $f'(a) = f(a)$ et $f'(b) = f(b)$. Montrer qu'il existe $c \in]a; b[$ tel que $f''(c) = f(c)$.

Indication : utiliser la fonction $x \mapsto (f'(x) - f(x))e^x$.

Exercice 2. Soit Δ une droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ où $(a; b) \neq (0; 0)$. Montrer que la distance de $C(x_C; y_C)$ à la droite Δ est égale à

$$d(C; \Delta) = \frac{|ax_C + by_C + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Sujet 3

Question de cours. Énoncer et démontrer les identités de polarisation.

Exercice 1. Déterminer

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{\sqrt[5]{1-x}} - \frac{1}{\sqrt[5]{1+x}} \right).$$

Exercice 2. Soit ABC un triangle et G son centre de gravité. En admettant que $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$, montrer que les triangles GAB , GAC et GBC ont la même aire.