

Banque PT - Maths B - 2023
Version pour juniors

Les parties en *bleu avec astérisque* ont été ajoutées ou modifiées par rapport sujet initial.

Dans cette épreuve, les candidats sont invités à illustrer, s'il le jugent nécessaire, leurs réponses avec un dessin.

Le sujet est composé de 4 parties. La partie 4 est indépendante du reste du sujet.

Première Partie.

On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}; D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}; R = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \text{ et } Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. (*) Soit r l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice R .
 - (a) Soit C_1, C_2, C_3 les trois vecteurs colonnes de R . Montrer que (C_1, C_2, C_3) est une base orthonormée directe de \mathbb{R}^3 .
 - (b) On admet alors que r est une rotation de l'espace d'axe dirigé par un vecteur \vec{e}_1 vérifiant $r(\vec{e}_1) = \vec{e}_1$ et d'angle θ défini par $1 + 2 \cos(\theta) = \text{Tr}(R)$ et $\sin(\theta)$ de même signe que $\det(\vec{e}_1, \vec{u}, r(\vec{u}))$, pour \vec{u} un vecteur quelconque non colinéaire à \vec{e}_1 .
 Déterminer un vecteur \vec{e}_1 solution et un angle θ associé.
2. Calculer $A_1 = RDR^{-1}$ et l'exprimer à l'aide de la matrice A . Les calculs devront figurer sur la copie.
3. Soit f l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A et f_1 celui associé à la matrice A_1 .
 - (a) Démontrer que f_1 est la composée commutative d'une symétrie s_1 et d'une projection p_1 dont on exprimera les matrices S_1 et P_1 dans la base canonique en fonction de R et de deux autres matrices diagonales à préciser.
 - (b) La symétrie s_1 est-elle unique ?
 - (c) La symétrie s_1 proposée à la question (a) est-elle orthogonale ?
4. (a) Justifier à l'aide des résultats précédents que la matrice A est diagonalisable *i.e. semblable à une matrice diagonale. Préciser ses valeurs propres.*
 - (b) Justifier que f est la composée de trois transformations simples que l'on précisera.
 - (c) Démontrer que le vecteur $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre de la matrice B *i.e. qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$, tel que $B \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.* Préciser λ .

- (d) Justifier que la matrice Q est inversible.
- (e) Sans calculer Q^{-1} , ~~ni le polynôme caractéristique de la matrice B~~ , démontrer que $B = QDQ^{-1}$.
- (f) Démontrer que les matrices A_1 et B sont semblables. On mettra en évidence la relation entre ces deux matrices.

Deuxième Partie.

L'espace affine euclidien \mathbb{R}^3 est muni de sa structure euclidienne usuelle et d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Pour $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, on considère la fonction vectorielle $f_{a,b,c}$ définie de \mathbb{R} dans \mathbb{R}^3 par :

$$\forall t \in \mathbb{R}, f_{a,b,c}(t) = \begin{pmatrix} be^t + ce^{-t} \\ 2a - be^t \\ a + ce^{-t} \end{pmatrix}.$$

On note F l'ensemble des fonction $f_{a,b,c}$ lorsque (a, b, c) parcourt \mathbb{R}^3 et $\mathcal{C}_{a,b,c}$ la courbe ~~correspondante à l'ensemble des points de l'espace de coordonnées $f_{a,b,c}(t)$ quand t parcourt \mathbb{R}~~ .

Enfin, les matrices B et Q sont celles qui ont été définies dans la première partie.

1. Démontrer que F est un espace vectoriel dont on précisera une base et la dimension.
2. Démontrer que tout élément f de F vérifie

$$\forall t \in \mathbb{R}, f'(t) = Bf(t)$$

où $f'(t)$ désigne la dérivée de la fonction f .

3. Démontrer que toutes les courbes $\mathcal{C}_{a,b,c}$ sont planes et qu'il est possible de choisir des plans qui les contiennent qui soient tous parallèles.
4. On considère la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ de \mathbb{R}^3 telle que la matrice de passage de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ à la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est la matrice Q .
 - (a) Exprimer chacun des vecteurs \vec{u}, \vec{v} et \vec{w} en fonction des vecteurs $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$.
 - (b) Justifier qu'une représentation paramétrique de $\mathcal{C}_{a,b,c}$ dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est

$$\begin{cases} X(t) = a \\ Y(t) = be^t \\ Z(t) = ce^{-t} \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

- (c) En déduire que chaque courbe $\mathcal{C}_{a,b,c}$ est incluse dans la courbe d'équation $\begin{cases} YZ = bc \\ X = a \end{cases}$ (i.e. une hyperbole d'équation $YC = bc$ incluse dans le plan $X = a$).

Troisième Partie.

L'espace affine euclidien \mathbb{R}^3 est muni de sa structure euclidienne usuelle et d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Dans cette partie, on note \mathcal{C} la courbe $\mathcal{C}_{1,1,1}$ définie dans la partie précédente.

Une représentation paramétrique de \mathcal{C} est donc : $\begin{cases} x(t) = e^t + e^{-t} \\ y(t) = 2 - e^t \\ z(t) = 1 + e^{-t} \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

On note $M(t)$ le point de \mathcal{C} de paramètre t .

1. Déterminer une représentation paramétrique et des équations cartésiennes de la tangente à \mathcal{C} au point $M(\ln(2))$ i.e. la droite passant par $M(\ln(2))$ et de vecteur directeur $M'(\ln(2))$.
2. Soit T un réel strictement positif. On note $L(T) = \int_0^T \left\| \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}(t) \right\| dt$ la longueur de la courbe \mathcal{C} entre les points $M(0)$ et $M(T)$.
 - (a) Etablir que pour tout $t \geq 0$, $2(e^t - e^{-t})^2 \leq \left\| \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}(t) \right\|^2 \leq 2e^{2t}$.
 - (b) En déduire un encadrement de $L(T)$ puis un équivalent de $L(T)$ lorsque T tend vers $+\infty$.
3. Soit Σ la surface d'équation $x^2 - (y - 2)^2 - (z - 1)^2 = 2$ et Ω le point de coordonnées $(0, 2, 1)$. Pour tout réel α , on note Π_α le plan d'équation $x = \alpha$.
 - (a) Montrer que $\mathcal{C} \subset \Sigma$.
 - (b) (*) Déterminer une équation du plan tangent en $M(\ln(2))$ à Σ i.e. le plan passant par $M(\ln(2))$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 2x(\ln(2)) \\ -2(y(\ln(2)) - 2) \\ -2(z(\ln(2)) - 2) \end{pmatrix}$.
 - (c) Déterminer la nature de la courbe $\Lambda_\alpha = \Sigma \cap \Pi_\alpha$ lorsque $|\alpha| \geq \sqrt{2}$. On précisera ses éléments caractéristiques.
Qu'en est-il lorsque $|\alpha| \leq \sqrt{2}$?
 - (d) (*) Justifier soigneusement que Σ est l'union de cercle coaxiaux dont on précisera l'axe Δ .
 - (e) (*) ~~Rappeler la définition d'une méridienne pour une surface de révolution.~~
 - (f) (*) Dessiner l'allure de la courbe d'équations $\begin{cases} x^2 - (y - 2)^2 = 2 \\ z = 1 \end{cases}$.
 - (g) Sur la feuille de papier millimétré ~~fournie (ben non)~~ tracer l'allure de Σ dans le repère $(\Omega; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
Il est conseillé d'orienter \vec{i} vers le haut.
 - (h) La surface de révolution obtenue en faisant tourner \mathcal{C} autour de Δ est-elle égale à Σ ?

Quatrième Partie.

L'espace affine euclidien \mathbb{R}^2 est muni de sa structure euclidienne usuelle et d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

On considère la courbe Γ de \mathbb{R}^2 de représentation paramétrique

$$\begin{cases} x(t) = e^t + e^{-t} \\ y(t) = 2 - e^t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

On note $A(t)$ le point de Γ de paramètre t .

1. Etablir les tableaux de variation des fonctions x et y . On précisera les limites aux bornes.
2. Déterminer la tangente à Γ au point $A(0)$ i.e. la droite passant par $A(0)$ et de vecteur directeur $\overrightarrow{OA'}(0)$.
3. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de Γ avec l'axe des abscisses et préciser un vecteur directeur et une équation cartésienne de la tangente à Γ en ce point.
4. (*) Déterminer l'équation de l'asymptote à Γ lorsque le paramètre t tend vers $-\infty$.

5. (*) Calculer $a = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{y(t)}{x(t)}$ puis $b = \lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) - ax(t)$ et en déduire qu'au voisinage de $+\infty$, Γ admet une asymptote oblique \mathcal{D} dont on précisera l'équation.

Préciser la position relative de Γ et \mathcal{D} .

6. Dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, tracer la courbe Γ , les tangentes et asymptotes déterminées dans les questions précédentes.

Unité : 3cm.

~~On utilisera pour cela la deuxième feuille de papier millimétré fournie. Hé non toujours pas.~~

7. On note $B(t)$ le point de \mathcal{D} ayant la même abscisse que $A(t)$ où $A(t)$ est le point de Γ de paramètre t .

(a) Pour tout $t \in \mathbb{R}$, calculer la longueur $d(t) = A(t)B(t)$.

(b) Les séries $\sum_{n \geq 0} d(n)$ et $\sum_{n \geq 1} d(\ln(n))$ sont-elles convergentes ?

Si oui, préciser leur somme.

(c) On note S la partie du plan incluse entre la restriction de la courbe Γ à \mathbb{R}_+ , la droite \mathcal{D} et la droite d'équation $x = 2$.

La partie S est-elle d'aire finie ?

Fin de l'épreuve