Corrigé du Devoir Surveillé 1 Fonctions réelles, trigonométrie

Problème I - Fonctions réelles

On considère les fonctions suivantes :

$$g : x \mapsto \frac{x^2 + 3}{x + 1} \quad \text{et} \quad f : x \mapsto x^2 - x + 4 \ln(1 + x).$$

Partie 1 : Etude de g

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. On a

$$g(x) \text{ existe} \quad \Leftrightarrow \quad x + 1 \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \neq -1.$$

Conclusion,

la fonction g est définie sur $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

2. Puisque l'ensemble $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ n'est pas centré en 0 (car $1 \in \mathcal{D}$ et $-1 \notin \mathcal{D}$), on en déduit directement que

la fonction g n'est ni paire ni impaire.

3. La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ comme quotient de fonctions qui le sont et dont le dénominateur ne s'annule pas et

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, \quad g'(x) = \frac{2x(x+1) - (x^2+3)}{(x+1)^2} = \frac{2x^2 + 2x - x^2 - 3}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x+1)^2}.$$

Conclusion, g est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ et

$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, \quad g'(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x+1)^2}.$

4. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. On a

$$g'(x) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 + 2x - 3 > 0 \quad \text{car } (x+1)^2 > 0 \text{ sur } \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$$

Soit Δ le discriminant associé, $\Delta = 4 - 4 \times (-3) = 4(1+3) = 4^2$. Donc les racines associées sont $\frac{-2+4}{2} = 1$ et $\frac{-2-4}{2} = -3$. Ainsi,

$$g'(x) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad x < -3 \text{ OU } x > 1.$$

Conclusion,

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$	
$g'(x)$	+	0	-	-	0	+

5. Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1; 0\}$, on a

$$g(x) = \frac{x^2 + 1 + \frac{3}{x^2}}{x + 1 + \frac{1}{x}} = x \frac{1 + \frac{3}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}}$$

Ainsi,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty.$$

D'autre part,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} x + 1 = 0^+ \quad \text{et} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} x^2 + 3 = 4.$$

Donc par quotient,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} g(x) = +\infty.$$

De même,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} g(x) = -\infty.$$

Conclusion,

$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$	$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} g(x) = -\infty,$	$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} g(x) = +\infty,$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.$
---	--	--	--

6. Par la question 4. la fonction g est strictement croissante sur $]-\infty; -3]$, strictement décroissante sur $[-3; -1[$ et sur $]-1; 1]$ et enfin à nouveau strictement croissante sur $[1; +\infty[$. Nous avons déjà les limites en $-\infty$, -1^- , -1^+ et $+\infty$. Calculons donc $g(-3)$ et $g(1)$:

$$g(-3) = \frac{9 + 3}{-3 + 1} = \frac{12}{-2} = -6 \quad \text{et} \quad g(1) = \frac{1 + 3}{1 + 1} = 2.$$

Conclusion,

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$
g	$-\infty$	-6	$-\infty$	2	$+\infty$

7. Par la question précédente, la fonction g admet un minimum local en $x = 1$ qui vaut 2.

8. Cependant la fonction g n'admet aucun minimum global. En effet, $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ ce qui implique que g n'est pas minorée et donc n'admet aucun minimum.

9. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} g(x) = -\frac{21}{2} &\Leftrightarrow \frac{x^2 + 3}{x + 1} = -\frac{21}{2} \\ &\Leftrightarrow 2x^2 + 6 = -21x - 21 \quad \text{car } x \neq -1 \\ &\Leftrightarrow 2x^2 + 21x + 27 = 0. \end{aligned}$$

Soit Δ le discriminant associé. On a

$$\Delta = 21^2 - 4 \times 2 \times 27 = 3^2 \times 7^2 - 8 \times 3 \times 3^2 = 3^2(49 - 24) = 3^2 \times 25 = 3^2 \times 5^2.$$

Donc les racines associées sont $\frac{-21+15}{4} = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2}$ et $\frac{-21-15}{4} = -\frac{36}{4} = -9$. Conclusion, pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$,

$$g(x) = -\frac{21}{2} \Leftrightarrow x = -9 \text{ OU } x = -\frac{3}{2}.$$

10. On a $g(2) = \frac{4+3}{2+1} = \frac{7}{3}$. Donc par le tableau de variations de la question 6. on a

x	-1	1	2
g	$+\infty$	2	$\frac{7}{3}$

Conclusion,

$$g(]-1; 2]) = [2; +\infty[.$$

D'autre part, par la question 9., on a $g(x) = -\frac{21}{2} \Leftrightarrow x = -9 \text{ OU } x = -\frac{3}{2}$. De même pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, on a les équivalences suivantes :

$$g(x) = -7 \Leftrightarrow \frac{x^2 + 3}{x + 1} = -7 \Leftrightarrow x^2 + 3 = -7x - 7 \Leftrightarrow x^2 + 7x + 10.$$

Soit Δ son discriminant, $\Delta = 49 - 40 = 9$. Donc les racines associées sont $\frac{-7+3}{2} = -2$ et $\frac{-7-3}{2} = -5$. Ainsi, toujours par la question 6.

x	$-\infty$	-9	-5	-3	-2	$-\frac{3}{2}$	-1	1	$+\infty$
g	$-\infty$	$-\frac{21}{2}$	-7	-6	-7	$-\frac{21}{2}$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$

Conclusion,

$$g^{\leftarrow} \left(\left[-\frac{21}{2}; -7 \right] \right) = [-9; -5] \cup \left[-2; -\frac{3}{2} \right].$$

11. Par ce qui précède, on a (par exemple) $g(-5) = -\frac{21}{2} = g(-2)$. Conclusion,

la fonction g n'est pas injective.

12. Toujours par la question 6. on observe que tout élément y dans $]-6; 2[$ n'admet aucun antécédent par la fonction g . Conclusion,

la fonction g n'est pas surjective.

13. Par la question 5. on a pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1; 0\}$,

$$g(x) = x \frac{1 + \frac{3}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.$$

Calculons $g(x)/x$. On a

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1; 0\}, \quad \frac{g(x)}{x} = \frac{1 + \frac{3}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}}.$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = 1.$$

Puis,

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1; 0\}, \quad g(x) - x = \frac{x^2 + 3}{x + 1} - x = \frac{x^2 + 3 - x^2 - x}{x + 1} = \frac{-x + 3}{x + 1} = \frac{-x}{x} \frac{1 - \frac{3}{x}}{1 + \frac{1}{x}} = -\frac{1 - \frac{3}{x}}{1 + \frac{1}{x}}.$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) - x = -1.$$

Conclusion,

Le graphe de g admet une asymptote en $+\infty$ d'équation $y = x - 1$.

14. De même, on a $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$. Puis

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 + \frac{3}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}} = 1.$$

Et enfin,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) - x = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{1 - \frac{3}{x}}{1 + \frac{1}{x}} = -1.$$

Conclusion,

Le graphe de g admet la même asymptote $y = x - 1$ en $-\infty$.

15. Soit $h \in \mathbb{R}^*$. Alors $h \neq 0$ et donc $-1 + h \neq -1$. De même $-h \neq 0$ donc $-1 - h \neq -1$. Ainsi, $-1 + h \in \mathcal{D}$ et $-1 - h \in \mathcal{D}$. Donc

$$\frac{g(-1 + h) + g(-1 - h)}{2} \text{ existe.}$$

Puis, on a les égalités entre réels suivantes :

$$\begin{aligned} \frac{g(-1 + h) + g(-1 - h)}{2} &= \frac{1}{2} \left(\frac{(-1 + h)^2 + 3}{-1 + h + 1} + \frac{(-1 - h)^2 + 3}{-1 - h + 1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1 - 2h + h^2 + 3}{h} + \frac{1 + 2h + h^2 + 3}{h} \right) \\ &= \frac{h^2 - 2h + 4 - h^2 - 2h - 4}{2h} \\ &= \frac{-4h}{2h} \\ &= -2. \end{aligned}$$

Conclusion,

$$\forall h \in \mathbb{R}^*, \quad \frac{g(-1 + h) + g(-1 - h)}{2} = -2.$$

16. Par la question précédente, on en déduit que

le graphe de g admet pour centre de symétrie le point $(-1; -2)$.

17. Par les questions précédentes, on obtient le graphe suivant :

Partie 2 : Etude de f

18. Soit $x \in \mathbb{R}$. On a les équivalences suivantes :

$$x \in U \quad \Leftrightarrow \quad f(x) \text{ existe} \quad \Leftrightarrow \quad x + 1 > 0 \quad \Leftrightarrow \quad x > -1.$$

Conclusion, la fonction f est définie sur

$$U =]-1; +\infty[.$$

19. On observe que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{2} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{2} \left(1 - \frac{2}{x}\right) = +\infty$. De plus, $\lim_{x \rightarrow +\infty} 4 \ln(1+x) = +\infty$. Par somme,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

D'autre part, $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} 4 \ln(1+x) = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} 4 \ln(t) = -\infty$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} \frac{x^2}{2} - x = \frac{3}{2}$. Par somme,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} f(x) = -\infty.$$

Conclusion,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

20. La fonction f est dérivable sur $U =]-1; +\infty[$ comme somme de fonctions qui le sont et

$$\forall x \in]-1; +\infty[, \quad f'(x) = x - 1 + 4 \frac{1}{x+1} = \frac{x^2 + x - x - 1 + 4}{x+1} = \frac{x^2 + 3}{x+1} = g(x).$$

Or par la partie précédente, on a $\forall x > -1, g(x) \geq 2 > 0$. Donc pour tout $x > -1, f'(x) > 0$. Donc la fonction f est strictement croissante sur $]-1; +\infty[$. Conclusion, à l'aide de la question précédente, on obtient,

x	-1	$+\infty$
f	$-\infty$	$+\infty$

21. Par ce qui précède,

- la fonction f est continue sur U ,
- la fonction f est strictement croissante sur U .

Donc par le théorème de la bijection, la fonction f définit une bijection de U dans

$$f(U) = f(]-1; +\infty[) = \left[\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[=]-\infty; +\infty[= \mathbb{R}.$$

Conclusion,

$$\boxed{f \text{ définit une bijection de } U =]-1; +\infty[\text{ dans } V = \mathbb{R}.$$

22. Soit $x \in]0; 1[$, on a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} \ln(1+x) > \frac{x(2-x)}{8} &\Leftrightarrow 8 \ln(1+x) > 2x - x^2 \\ &\Leftrightarrow 4 \ln(1+x) > x - \frac{x^2}{2} \\ &\Leftrightarrow \frac{x^2}{2} - x + 4 \ln(1+x) > 0 \\ &\Leftrightarrow f(x) > 0. \end{aligned}$$

Or par la question 20. la fonction f est strictement croissante sur $U =]-1; +\infty[$ et donc sur $]0; 1[$.
Donc pour tout $x \in]0; 1[$,

$$f(x) > f(0) = 0 - 0 + 4 \ln(1) = 0.$$

Donc pour tout $x \in]0; 1[$, $f(x) > 0$. Donc par les équivalences précédentes, on conclut que

$$\boxed{\forall x \in]0; 1[, \quad \ln(1+x) > \frac{x(2-x)}{8}.$$

23. Soit $x \in]1; +\infty[$. Posons $y = \frac{1}{x}$. Alors, $y \in]0; 1[$. Donc par la question précédente,

$$\ln(1+y) > \frac{y(2-y)}{8}.$$

Autrement dit,

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) > \frac{\frac{1}{x}(2 - \frac{1}{x})}{8} \Leftrightarrow \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) > \frac{2x-1}{8x^2}.$$

Conclusion,

$$\boxed{\forall x > 1, \quad \ln(x+1) - \ln(x) > \frac{2x-1}{8x^2}.$$

Problème II - Trigonométrie

Partie 1 : Une équation

On considère l'équation suivante d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

$$(E) \quad \cos(x) + \cos(3x) = \frac{1}{2}.$$

Soit $x \in \mathbb{R}$.

1. On observe les points suivants :

- la fonction cosinus est continue sur $[0; \frac{\pi}{2}]$,
- la fonction cosinus est strictement croissante sur $[0; \frac{\pi}{2}]$
- $\frac{1+\sqrt{5}}{4} > 0$ et $\frac{1+\sqrt{5}}{4} < \frac{1+\sqrt{9}}{4} = \frac{1+3}{4} = 1$. Donc $\frac{1+\sqrt{5}}{4} \in]0; 1[=]\cos(\frac{\pi}{2}); \cos(0)[$.

Donc par le théorème de la bijection (ou corollaire du théorème des valeurs intermédiaires),

$$\boxed{\exists! \alpha \in]0; \frac{\pi}{2}[, \quad \cos(\alpha) = \frac{1 + \sqrt{5}}{4} .}$$

De même,

- la fonction cosinus est continue sur $[0; \frac{\pi}{2}]$,
- la fonction cosinus est strictement croissante sur $[0; \frac{\pi}{2}]$
- $\frac{\sqrt{5}-1}{4} > 0$ et $\frac{\sqrt{5}-1}{4} < \frac{\sqrt{5}}{4} < \frac{3}{4} < 1$. Donc $\frac{\sqrt{5}-1}{4} \in]0; 1[=]\cos(\frac{\pi}{2}); \cos(0)[$.

Conclusion, par le théorème de la bijection,

$$\boxed{\exists! \beta \in]0; \frac{\pi}{2}[, \quad \cos(\beta) = \frac{\sqrt{5} - 1}{4} .}$$

2. (a) On a les égalités entre réels suivantes :

$$\begin{aligned} \cos(3x) &= \cos(2x + x) \\ &= \cos(2x)\cos(x) - \sin(2x)\sin(x) \\ &= (2\cos^2(x) - 1)\cos(x) - 2\sin(x)\cos(x)\sin(x) \\ &= 2\cos^3(x) - \cos(x) - 2\sin^2(x)\cos(x) \\ &= 2\cos^3(x) - \cos(x) - 2(1 - \cos^2(x))\cos(x) \\ &= 4\cos^3(x) - 3\cos(x). \end{aligned}$$

Vérification, si $x = \frac{\pi}{4}$ par exemple, $\cos(3x) = \cos(\frac{3\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $4\cos^3(x) - 3\cos(x) = 4\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3 - 3\frac{\sqrt{2}}{2} = 4\frac{2\sqrt{2}}{8} - 3\frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} - 3\frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ OK!

Conclusion,

$$\boxed{\cos(3x) = 4\cos^3(x) - 3\cos(x).}$$

(b) Par la question précédente, on a

$$\begin{aligned} (E) \quad \cos(x) + \cos(3x) &= \frac{1}{2} & \Leftrightarrow & \cos(x) + 4\cos^3(x) - 3\cos(x) = \frac{1}{2} \\ & & \Leftrightarrow & 4\cos^3(x) - 2\cos(x) - \frac{1}{2} = 0 \\ & & \Leftrightarrow & \cos^3(x) - \frac{1}{2}\cos(x) - \frac{1}{8} = 0. \end{aligned}$$

Conclusion,

$$(E) \quad \Leftrightarrow \quad \cos^3(x) - \frac{1}{2} \cos(x) - \frac{1}{8} = 0.$$

3. (a) Par la formule $\cos(p) + \cos(q) = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$, on a

$$\begin{aligned} \cos(x) + \cos(3x) &= 2 \cos\left(\frac{x+3x}{2}\right) \cos\left(\frac{x-3x}{2}\right) \\ &= 2 \cos(2x) \cos(-x) \\ &= 2 \cos(2x) \cos(x) \quad \text{par parité du cosinus.} \end{aligned}$$

Conclusion,

$$\cos(x) + \cos(3x) = 2 \cos(2x) \cos(x).$$

Vérification, si $x = \frac{\pi}{3}$, on a $\cos(x) + \cos(3x) = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$ et $2 \cos(2x) \cos(x) = 2 \left(-\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}$
OK!

(b) Par la question précédente,

$$(E) \quad \cos(x) + \cos(3x) = \frac{1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad 2 \cos(2x) \cos(x) = \frac{1}{2}.$$

Or $\cos(2x) = 2 \cos^2(x) - 1$. Donc

$$\begin{aligned} (E) \quad &\Leftrightarrow \quad 2(2 \cos^2(x) - 1) \cos(x) = \frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow \quad 4 \cos^3(x) - 2 \cos(x) = \frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow \quad 4 \cos^3(x) - 2 \cos(x) - \frac{1}{2} = 0 \\ &\Leftrightarrow \quad \cos^3(x) - \frac{1}{2} \cos(x) - \frac{1}{8} = 0. \end{aligned}$$

Conclusion,

$$(E) \quad \Leftrightarrow \quad \cos^3(x) - \frac{1}{2} \cos(x) - \frac{1}{8} = 0.$$

4. Méthode 1. On note que si $X = -\frac{1}{2}$, on a

$$X^3 - \frac{X}{2} - \frac{1}{8} = -\frac{1}{8} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = 0.$$

Donc $-\frac{1}{2}$ est une racine de $X^3 - \frac{X}{2} - \frac{1}{8}$. Donc $X + \frac{1}{2}$ divise $X^3 - \frac{X}{2} - \frac{1}{8}$:

$$\begin{array}{r|l} X^3 & -\frac{X}{2} - \frac{1}{8} \\ -(X^3 + \frac{X^2}{2}) & \\ \hline -\frac{X^2}{2} & -\frac{X}{2} - \frac{1}{8} \\ -(-\frac{X^2}{2} - \frac{X}{4}) & \\ \hline & -\frac{X}{4} - \frac{1}{8} \\ & -(-\frac{X}{4} - \frac{1}{8}) \\ \hline & 0 \end{array}$$

Conclusion, on a $a = 1$, $b = -\frac{1}{2}$ et $c = -\frac{1}{4}$,

$$X^3 - \frac{X}{2} - \frac{1}{8} = \left(X + \frac{1}{2}\right) \left(X^2 - \frac{X}{2} - \frac{1}{4}\right).$$

Méthode 2. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. On a

$$\left(X + \frac{1}{2}\right)(aX^2 + bX + c) = aX^3 + bX^2 + cX + \frac{a}{2}X^2 + \frac{b}{2}X + \frac{c}{2} = aX^3 + \left(b + \frac{a}{2}\right)X^2 + \left(c + \frac{b}{2}\right)X + \frac{c}{2}.$$

Donc pour que $X^3 - \frac{X}{2} - \frac{1}{8} = (X + \frac{1}{2})(aX^2 + bX + c)$, on note qu'il suffit de prendre

$$\begin{cases} a = 1 \\ b + \frac{a}{2} = 0 \\ c + \frac{b}{2} = -\frac{1}{2} \\ \frac{c}{2} = -\frac{1}{8} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -\frac{a}{2} = -\frac{1}{2} \\ c = -\frac{b}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4} \\ c = -\frac{1}{4}. \end{cases}$$

Conclusion, en prenant $a = 1, b = -\frac{1}{2}, c = -\frac{1}{4}$, on a

$$\boxed{X^3 - \frac{X}{2} - \frac{1}{8} = \left(X + \frac{1}{2}\right)\left(X^2 - \frac{X}{2} - \frac{1}{4}\right)}.$$

5. Soient $\mathcal{S}_E$ l'ensemble des solutions de (E) et $x \in \mathcal{S}_E$. Par la question 2.b ou 3.b on a

$$x \in \mathcal{S}_E \Leftrightarrow \cos^3(x) - \frac{1}{2}\cos(x) - \frac{1}{8} = 0.$$

Posons $X = \cos(x)$. Dès lors,

$$x \in \mathcal{S}_E \Leftrightarrow X^3 - \frac{X}{2} - \frac{1}{8} = 0.$$

Donc par la question précédente,

$$x \in \mathcal{S}_E \Leftrightarrow \left(X + \frac{1}{2}\right)\left(X^2 - \frac{X}{2} - \frac{1}{4}\right) = 0 \Leftrightarrow X = -\frac{1}{2} \text{ OU } X^2 - \frac{X}{2} - \frac{1}{4} = 0.$$

Soit Δ le discriminant de $X^2 - \frac{X}{2} - \frac{1}{4}$. On a $\Delta = \frac{1}{4} + 1 = \frac{5}{4}$. Donc les racines associées sont $\frac{1/2 + \sqrt{5}/2}{2} = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}$ et $\frac{1 - \sqrt{5}}{4}$. Ainsi,

$$x \in \mathcal{S}_E \Leftrightarrow X = -\frac{1}{2} \text{ OU } X = \frac{1 + \sqrt{5}}{4} \text{ OU } X = \frac{1 - \sqrt{5}}{4}.$$

Conclusion, pour $x \in \mathcal{S}_E$,

$$\boxed{\cos(x) = -\frac{1}{2} \text{ OU } \cos(x) = \frac{1 + \sqrt{5}}{4} \text{ OU } \cos(x) = \frac{1 - \sqrt{5}}{4}}.$$

6. Par la question précédente, on a même

$$x \in \mathcal{S}_E \Leftrightarrow \cos(x) = -\frac{1}{2} \text{ OU } \cos(x) = \frac{1 + \sqrt{5}}{4} \text{ OU } \cos(x) = \frac{1 - \sqrt{5}}{4}.$$

Par la question 1.

$$\begin{aligned} x \in \mathcal{S}_E &\Leftrightarrow \cos(x) = -\frac{1}{2} \text{ OU } \cos(x) = \cos(\alpha) \text{ OU } \cos(x) = -\cos(\beta) = \cos(\pi - \beta) \\ &\Leftrightarrow \cos(x) = -\frac{1}{2} \text{ OU } \cos(x) = \cos(\alpha) \text{ OU } \cos(x) = -\cos(\beta) = \cos(\pi - \beta) \\ &\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, \quad x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ OU } x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ OU } x = \alpha + 2k\pi \\ &\quad \text{OU } x = -\alpha + 2k\pi \text{ OU } x = \pi - \beta + 2k\pi \text{ OU } x = -\pi + \beta + 2k\pi. \end{aligned}$$

Conclusion,

$$\boxed{\mathcal{S}_E = \left\{ \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \alpha + 2k\pi, -\alpha + 2k\pi, \pi - \beta + 2k\pi, -\pi + \beta + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}}.$$

Partie 2 : Calcul de S .

Posons

$$\theta = \frac{\pi}{5} \quad \text{et} \quad S = \cos(\theta) + \cos(3\theta).$$

7. On observe que $3\theta = \frac{3\pi}{5}$ et $2\theta = \frac{2\pi}{5}$. Donc $3\theta + 2\theta = \pi$ i.e. $3\theta = \pi - 2\theta$. Dès lors,

$$\cos(3\theta) = \cos(\pi - 2\theta) = -\cos(2\theta).$$

De même $4\theta = \pi - \theta$ et donc $\cos(4\theta) = -\cos(\theta)$. Conclusion,

$$\boxed{\cos(3\theta) = -\cos(2\theta) \quad \text{et} \quad \cos(4\theta) = -\cos(\theta).}$$

8. Par la question précédente,

$$S = \cos(\theta) + \cos(3\theta) = \cos(\theta) - \cos(2\theta).$$

Or $0 < \theta < 2\theta < \frac{\pi}{2}$. Donc par la stricte décroissance de la fonction cosinus sur $[0; \frac{\pi}{2}]$,

$$\cos(\theta) > \cos(2\theta) \quad \Leftrightarrow \quad \cos(\theta) - \cos(2\theta) > 0.$$

Conclusion,

$$\boxed{S > 0.}$$

9. On a

$$2023 = 10 \times 202 + 3 = 5 \times 202 \times 2 + 3.$$

Donc

$$2023\theta = 2023 \frac{\pi}{5} = 202 \times 2\pi + \frac{3\pi}{5}.$$

Donc par la 2π -périodicité de la fonction cosinus,

$$\cos(2023\theta) = \cos\left(202 \times 2\pi + \frac{3\pi}{5}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{5}\right) = \cos(3\theta).$$

Puis par la question 7.

$$\cos(2023\theta) = -\cos(2\theta).$$

D'autre part, $6\theta = \frac{6\pi}{5} = \pi + \frac{\pi}{5}$. Donc

$$\cos(6\theta) = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{5}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = -\cos(\theta).$$

Conclusion,

$$\boxed{\cos(2023\theta) = -\cos(2\theta) \quad \text{et} \quad \cos(6\theta) = -\cos(\theta).}$$

10. *Méthode 1.* On a les égalités entre réels suivantes :

$$\begin{aligned} S^2 &= (\cos(\theta) + \cos(3\theta))^2 \\ &= \cos^2(\theta) + 2\cos(\theta)\cos(3\theta) + \cos^2(3\theta) \\ &= \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} + \cos(\theta + 3\theta) + \cos(\theta - 3\theta) + \frac{1 + \cos(6\theta)}{2} \\ &= 1 + \frac{\cos(2\theta) + \cos(4\theta)}{2} + \cos(4\theta) + \cos(2\theta) \\ &= 1 + \frac{3}{2}(\cos(2\theta) + \cos(4\theta)). \end{aligned}$$

Par la question 7. $\cos(4\theta) = -\cos(\theta)$. Conclusion,

$$S^2 = 1 + \frac{3}{2}(\cos(2\theta) - \cos(\theta)).$$

Méthode 2. On a vu que $S = \cos(\theta) - \cos(2\theta)$. Par suite, on a les égalités entre réels suivantes :

$$\begin{aligned} S^2 &= (\cos(\theta) - \cos(2\theta))^2 \\ &= \cos^2(\theta) - 2\cos(\theta)\cos(2\theta) + \cos^2(2\theta) \\ &= \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} - \cos(\theta + 2\theta) - \cos(\theta - 2\theta) + \frac{1 + \cos(4\theta)}{2} \\ &= 1 + \frac{\cos(2\theta) + \cos(4\theta)}{2} - \cos(3\theta) - \cos(\theta). \end{aligned}$$

Par la question 7.

$$\begin{aligned} S^2 &= 1 + \frac{\cos(2\theta) - \cos(\theta)}{2} + \cos(2\theta) - \cos(\theta) \\ &= 1 + \frac{3}{2}(\cos(2\theta) - \cos(\theta)). \end{aligned}$$

Conclusion,

$$S^2 = 1 + \frac{3}{2}(\cos(2\theta) - \cos(\theta)).$$

11. On a vu que $S = \cos(\theta) - \cos(2\theta)$. Donc par la question précédente,

$$S^2 = 1 - \frac{3}{2}S \quad \Leftrightarrow \quad S^2 + \frac{3}{2}S - 1 = 0.$$

12. Soit Δ le discriminant associé à $S^2 + \frac{3}{2}S - 1$. On a

$$\Delta = \frac{9}{4} + 4 = \frac{9 + 16}{4} = \frac{25}{4}.$$

Les racines associées sont $\frac{-3/2 - 5/2}{2} = \frac{-8}{4} = -2$ et $\frac{-3/2 + 5/2}{2} = \frac{1}{2}$. Ainsi par la question précédente, on a

$$S = -2 \text{ OU } S = \frac{1}{2}.$$

Or par la question 8. $S > 0$. Conclusion,

$$S = \frac{1}{2}.$$

Partie 3 : Valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$ et applications

13. Par la partie précédente, on a

$$S = \cos(\theta) + \cos(3\theta) = \frac{1}{2}.$$

Donc θ est solution de l'équation (E). Donc par la question 5.

$$\cos(\theta) = -\frac{1}{2} \text{ OU } \cos(\theta) = \frac{1 + \sqrt{5}}{4} \text{ OU } \cos(\theta) = \frac{1 - \sqrt{5}}{4}.$$

Or $0 < \frac{\pi}{5} < \frac{\pi}{2}$. Donc par la stricte décroissance de la fonction cosinus sur $[0; \frac{\pi}{2}]$, $\cos(\theta) > 0$. Or $-\frac{1}{2} < 0$ et $\frac{1 - \sqrt{5}}{4} < 0$. Nécessairement,

$$\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}.$$

14. Par la formule fondamentale,

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{5}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{5}\right) = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \sin^2\left(\frac{\pi}{5}\right) = 1 - \cos^2\left(\frac{\pi}{5}\right).$$

Par la question précédente,

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{5}\right) = 1 - \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{4}\right)^2 = 1 - \frac{1 + 2\sqrt{5} + 5}{16} = \frac{16 - 6 - 2\sqrt{5}}{16} = \frac{10 - 2\sqrt{5}}{16}.$$

Donc

$$\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) = \pm \sqrt{\frac{10 - 2\sqrt{5}}{16}} = \pm \frac{\sqrt{2}\sqrt{5 - \sqrt{5}}}{4}$$

Or $\frac{\pi}{5} \in]0; \frac{\pi}{2}[$ donc $\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) > 0$. Conclusion,

$$\boxed{\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{2}\sqrt{5 - \sqrt{5}}}{4}}.$$

15. Soit $x \in \mathbb{R}$ et

$$(I) \quad 2 \cos(2x) + 4\sqrt{3} \sin(x) \cos(x) \leq 1 + \sqrt{5}.$$

On sait que $2 \sin(x) \cos(x) = \sin(2x)$. Donc

$$(I) \quad \Leftrightarrow \quad 2 \cos(2x) + 2\sqrt{3} \sin(2x) \leq 1 + \sqrt{5}.$$

Faisons apparaître la forme polaire :

$$\begin{aligned} (I) \quad &\Leftrightarrow \quad \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(2x) \leq \frac{1 + \sqrt{5}}{4} \\ &\Leftrightarrow \quad \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \cos(2x) + \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \sin(2x) \leq \frac{1 + \sqrt{5}}{4} \\ &\Leftrightarrow \quad \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \leq \frac{1 + \sqrt{5}}{4} \\ &\Leftrightarrow \quad \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \leq \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \quad \text{par la question 13.} \\ &\Leftrightarrow \quad \exists k \in \mathbb{Z}, \quad \frac{\pi}{5} + 2k\pi \leq 2x - \frac{\pi}{3} \leq \frac{9\pi}{5} + 2k\pi \\ &\Leftrightarrow \quad \exists k \in \mathbb{Z}, \quad \frac{\pi}{5} + \frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq 2x \leq \frac{9\pi}{5} + \frac{\pi}{3} + 2k\pi \\ &\Leftrightarrow \quad \exists k \in \mathbb{Z}, \quad \frac{8\pi}{15} + 2k\pi \leq 2x \leq \frac{32\pi}{15} + 2k\pi \\ &\Leftrightarrow \quad \exists k \in \mathbb{Z}, \quad \frac{4\pi}{15} + k\pi \leq x \leq \frac{16\pi}{15} + k\pi. \end{aligned}$$

Conclusion,

$$\boxed{\mathcal{S}_I = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[\frac{4\pi}{15} + k\pi; \frac{16\pi}{15} + k\pi \right]}.$$

Problème III - Bijection

On définit

$$f : \begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{2e^x + 3}{e^x + 1}. \end{aligned}$$

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $e^x + 1 > 0$. Donc la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions qui le sont et dont le dénominateur ne s'annule pas. De plus,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = \frac{2e^x(e^x + 1) - (2e^x + 3)e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^x(2e^x + 2 - 2e^x - 3)}{(e^x + 1)^2} = -\frac{e^x}{(e^x + 1)^2}.$$

Conclusion, la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = -\frac{e^x}{(e^x + 1)^2}.}$$

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$ et $(e^x + 1)^2 > 0$. Donc par la question précédente,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) < 0.$$

La fonction f est alors strictement décroissante sur $\mathbb{R}$. De plus, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ donc

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2e^x + 3}{e^x + 1} = 3.$$

Enfin, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{2e^x + 3}{e^x + 1} = \frac{2e^x}{e^x + 1} + \frac{3}{e^x + 1} = 2 \frac{1 + \frac{3}{2}e^{-x}}{1 + e^{-x}}.$$

D'où

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{3}{2}e^{-x}}{1 + e^{-x}} = 2.$$

Conclusion,

x	$-\infty$	$+\infty$
f	3	2

3. On a vu que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$. Directement, on conclut que

$\boxed{\text{le graphe de } f \text{ présente une asymptote horizontale d'équation } y = 2 \text{ en } +\infty.}$

4. Puisque f est dérivable en 0, son graphe admet une tangente en 0 d'équation

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) = -\frac{1}{(1 + 1)^2}x + \frac{2 + 3}{1 + 1} = -\frac{x}{4} + \frac{5}{2} = \frac{10 - x}{4}.$$

Conclusion, le graphe de f admet une tangente en 0 d'équation

$$\boxed{y = \frac{10 - x}{4}.}$$

5. Par ce qui précède, on a

- f est continue sur $\mathbb{R}$,

- f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Donc par le théorème de la bijection, f définit une bijection de $\mathbb{R}$ dans

$$J = f(\mathbb{R}) = \left] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right[=]2; 3[.$$

Conclusion,

$$f \text{ définit une bijection de } \mathbb{R} \text{ dans } J =]2; 3[.$$

6. Par la question précédente et le théorème de la bijection, on sait de plus que f^{-1} est de même stricte monotonie que f donc f^{-1} est strictement décroissante sur J . De plus, puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$, on a

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} f^{-1}(x) = +\infty. \text{ De même } \lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x < 3}} f^{-1}(x) = -\infty. \text{ Conclusion,}$$

x	2	3
f^{-1}	$+\infty$	$-\infty$

Enfin, par le cours, on sait que le graphe de f^{-1} s'obtient à partir de celui de f

$$\text{par la symétrie axiale d'axe la droite d'équation } y = x.$$

7. On a les points suivantes :

- la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$,
- la fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$,
- $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = -\frac{e^x}{(1+e^x)^2} \neq 0$.

Donc par le théorème de la dérivée de la fonction réciproque,

$$f^{-1} \text{ est dérivable sur } J = f(\mathbb{R}) =]2; 3[.$$

De plus,

$$\forall x \in]2; 3[, \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

Or pour tout $u \in \mathbb{R}, f'(u) = -\frac{e^u}{(1+e^u)^2}$. Conclusion,

$$\forall x \in]2; 3[, \quad (f^{-1})'(x) = -\left(1 + e^{f^{-1}(x)}\right) e^{-f^{-1}(x)}.$$

8. Soit $x \in \mathbb{R}$. On a les égalités entre réels suivantes :

$$\begin{aligned} f^2(x) - 5f(x) + 6 &= \left(\frac{2e^x + 3}{e^x + 1}\right)^2 - 5\frac{2e^x + 3}{e^x + 1} + 6 \\ &= \frac{4e^{2x} + 12e^x + 9}{(e^x + 1)^2} - \frac{(10e^x + 15)(e^x + 1)}{(e^x + 1)^2} + \frac{6(e^x + 1)^2}{(e^x + 1)^2} \\ &= \frac{4e^{2x} + 12e^x + 9 - 10e^{2x} - 10e^x - 15e^x - 15 + 6e^{2x} + 12e^x + 6}{(e^x + 1)^2} \\ &= \frac{-e^x}{(e^x + 1)^2} \\ &= f'(x). \end{aligned}$$

Conclusion,

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, \quad f^2(x) - 5f(x) + 6 = f'(x).}$$

9. On a vu que

$$\forall x \in J, \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

Donc par la question précédente,

$$\forall x \in J, \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{(f(f^{-1}(x)))^2 - 5f(f^{-1}(x)) + 6} = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}.$$

Conclusion,

$$\boxed{\forall x \in J, \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}.$$

10. On observe que 2 et 3 sont racines de $x^2 - 5x + 6$ (car le produit fait 6 et la somme 5, sinon faire un discriminant) donc par la question précédente,

$$\forall x \in]2; 3[, \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{(x-2)(x-3)}.$$

Méthode 1. Par le théorème de la décomposition en éléments simples (à venir!), il existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\forall x \in]2; 3[, \quad (f^{-1})'(x) = \frac{a}{x-3} + \frac{b}{x-2}.$$

Dès lors,

$$a = \lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x < 3}} (x-3)(f^{-1})'(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x < 3}} \frac{1}{x-2} = \frac{1}{3-2} = 1.$$

De même,

$$b = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} (x-2)(f^{-1})'(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} \frac{1}{x-3} = \frac{1}{2-3} = -1.$$

Conclusion, pour $a = 1$ et $b = -1$,

$$\boxed{\forall x \in]2; 3[, \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-2}.$$

Méthode 2. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Pour tout $x \in]2; 3[$, on a

$$\frac{a}{x-3} + \frac{b}{x-2} = \frac{ax - 2a + bx - 3b}{(x-3)(x-2)} = \frac{(a+b)x - 2 - 3b}{(x-3)(x-2)}.$$

On note alors que pour avoir $(f^{-1})'(x) = \frac{a}{x-3} + \frac{b}{x-2}$, il SUFFIT de prendre

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ -2a - 3b = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -a \\ -2a + 3a = 1 \Leftrightarrow a = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -1. \end{cases}$$

Conclusion, pour $a = 1$ et $b = -1$,

$$\boxed{\forall x \in]2; 3[, \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-2}.$$

11. La fonction $x \mapsto \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-2}$ est continue sur l'intervalle $]2; 3[$. Donc en primitivant la relation précédente, on a

$$\exists C \in \mathbb{R}, \forall x \in]2; 3[, \quad f^{-1}(x) = \ln(|x-3|) - \ln(|x-2|) + C.$$

Or pour tout $x \in]2; 3[$, $x-3 < 0$ et $x-2 > 0$. Ainsi,

$$\forall x \in]2; 3[, \quad f^{-1}(x) = \ln(3-x) - \ln(x-2) + C.$$

Or, on a $f(0) = \frac{2+3}{1+1} = \frac{5}{2}$. Donc $f^{-1}\left(\frac{5}{2}\right) = 0$. Ainsi,

$$\ln\left(3 - \frac{5}{2}\right) - \ln\left(\frac{5}{2} - 2\right) + C = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \ln\left(\frac{1}{2}\right) - \ln\left(\frac{1}{2}\right) + C = 0 \quad \Leftrightarrow \quad C = 0.$$

Conclusion,

$$\boxed{\forall x \in]2; 3[, \quad f^{-1}(x) = \ln(3-x) - \ln(x-2).}$$

12. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $y \in]2; 3[$. On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} y = f(x) &\Leftrightarrow y = \frac{2e^x + 3}{e^x + 1} \\ &\Leftrightarrow y(e^x + 1) = 2e^x + 3 && \text{car } e^x + 1 \neq 0 \\ &\Leftrightarrow e^x(y-2) = 3-y \\ &\Leftrightarrow e^x = \frac{3-y}{y-2} && \text{car } y > 2 \\ &\Leftrightarrow x = \ln\left(\frac{3-y}{y-2}\right) && \text{car } \frac{3-y}{y-2} > 0 \text{ car } 3-y > 0 \text{ et } y-2 > 0 \\ &\Leftrightarrow x = \ln(3-y) - \ln(y-2) && \text{car } 3-y > 0 \text{ et } y-2 > 0. \end{aligned}$$

Conclusion, on retrouve bien le résultat de la question précédente,

$$\boxed{\forall x \in]2; 3[, \quad f^{-1}(x) = \ln(3-x) - \ln(x-2).}$$