

Chapitre XVI : Les polynômes

Dans tout ce chapitre $\mathbb{K}$ désigne le corps $\mathbb{R}$ ou le corps $\mathbb{C}$.

Introduction

Formellement, on définit un polynôme comme une suite $(a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ à valeurs dans $\mathbb{K}$, dont tous les termes sont nuls à partir d'un certain rang.

Par exemple, le polynôme $4X^7 + 2X^6 - X^5 + 2X^3 - 8X - 12$ s'écrit comme la suite

$$(-12, -8, 0, 2, 0, -1, 2, 4, 0, 0, 0, \dots).$$

Il est assez facile de vérifier que la somme de deux suites ayant un nombre fini de termes non nuls (donc de deux polynômes) est encore une suite ayant un nombre fini de termes non nuls : pour $n, m \in \mathbb{N}$ avec $n \geq m$,

$$(a_0, a_1, \dots, a_m, \dots, a_n, 0, 0, \dots) + (b_0, b_1, \dots, b_m, 0, 0, \dots) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots, a_m + b_m, a_{m+1}, \dots, a_n, 0, 0, \dots).$$

On peut multiplier également une suite ayant un nombre fini de termes non nul par un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ et obtenir une suite ayant un nombre fini de termes non nuls : pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\lambda(a_0, a_1, \dots, a_m, \dots, a_n, 0, 0, \dots) = (\lambda a_0, \lambda a_1, \dots, \lambda a_n, 0, 0, \dots).$$

On appelle maintenant 1 la suite $(1, 0, 0, \dots)$, qui est bien un polynôme, X la suite $(0, 1, 0, 0, \dots)$ qui est aussi un polynôme, X^2 la suite $(0, 0, 1, 0, \dots)$ et ainsi de suite : pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$X^k = (0, 0, \dots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{position } k}}{1}, 0, \dots).$$

On s'aperçoit alors que

$$(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, 0, 0, \dots) = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots + a_n X^n.$$

Le grand X désigne l'inconnu des polynômes et n'est donc pas un réel. L'utilité des polynômes est de définir des opérations algébriques sans donner la nature explicite de X puis de transposer ces résultats à tout ensemble d'objets mathématiques pourvu qu'il soit compatible avec quelques règles élémentaires d'addition et de multiplication (les réels, les matrices, les fonctions,...).

I Définition

Définition I.1

- On appelle **polynôme** P tout $n+1$ -uplet, $n \in \mathbb{N}$, de $\mathbb{K} : (a_0, a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$ que l'on écrit

.....

- Le scalaire a_k est appelé le k -ième **coefficient** de P .
- On note $\mathbb{K}[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Remarque 1 :

- De la même façon que $i = (0, 1)$ est un complexe que l'on ne présente pas à chaque raisonnement, l'indéterminée X n'est pas une *variable*. On dira donc : soit $P \in \mathbb{K}[X]$ le polynôme défini par $P = 1 + X + X^2$ et non soit P le polynôme défini par $X \mapsto 1 + X + X^2$ ou encore défini pour tout $X \in \mathbb{K}$, par $P(X) = 1 + X + X^2$.
- L'étude des polynômes de façon formelle (en gardant l'indéterminée X) peut par la suite s'appliquer à obtenir des résultats sur les réels par exemple en s'intéressant à $x \mapsto x^2 + x + 1$, sur les fonctions en regardant $f \circ f + f + \text{Id}$, sur les matrices en regardant $A^2 + A + I_n$. On peut même appliquer les polynômes... à des polynômes! en regardant $1 + P + P^2$ (cf plus loin pour le produit de polynômes).

- Les polynômes constants s'écrivent simplement $P = a_0 \in \mathbb{K}$ et donc on injecte $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{K}[X]$.
- On note parfois $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$, avec la convention $X^0 = 1$, le polynôme P . Cela implique que les coefficients a_k sont tous nuls à partir d'un certain rang.
- On appelle polynôme nul le polynôme dont tous les coefficients sont nuls.
- Deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients coïncident :

$$P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k X^k = Q \quad \Leftrightarrow \quad \forall k \in \mathbb{N}, a_k = b_k.$$

Définition I.2

Soient $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k X^k$ deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$.

- (*Addition*). On pose $P + Q$ le polynôme défini par

$$P + Q = \dots\dots\dots$$

- (*Multiplication*). On pose PQ le polynôme défini par

$$PQ = \dots\dots\dots$$

- (*Multiplication par un scalaire*). On pose λP le polynôme défini par

$$\lambda P = \dots\dots\dots$$

Exemple 2 :

1. On pose $P = 1 + 2X - 3X^2 + X^3$ et $Q = X - X^2$. Calculer $2P$, PQ et $P + Q$ avec les formules et montrer que cela correspond aux calculs classiques.

Définition I.3

Soient P et Q deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$, $n \in \mathbb{N}$. On pose $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$. On définit alors la composée $P \circ Q$ par

$$P \circ Q = P(Q) = \dots\dots\dots$$

Exemple 3 : Soient $P = 1 + X + X^2$ et $Q = 1 + X$. Calculer $Q \circ P$ et $P \circ Q$.

Exemple 4 : Pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, on a $P \circ X = P$. On note alors souvent $P(X) = P \circ X = P$.

Attention cependant à ne pas confondre $P(X)$ qui est une composition et PX qui est un produit ou plus généralement ne pas confondre $P(Q)$ et PQ .

Définition I.4

- Soit $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$ un polynôme, on définit le **degré** de P par

$$\deg(P) = \begin{cases} \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \end{cases}$$

- Un polynôme ayant un seul coefficient non nul $R = a_n X^n$ est appelé un monôme.
- Si $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k \neq 0$ et $n = \deg(P) \in \mathbb{N}$, alors le coefficient a_n est appelé le **coefficient dominant** de P et le monôme $a_n X^n$ le **terme dominant** de P . Le polynôme P s'écrit alors $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0$.
- Si le coefficient dominant du polynôme P est égal à 1, on dit que le polynôme P est **unitaire** ou normalisé.

Proposition I.5

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

1. $\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$, avec égalité si $\deg(P) \neq \deg(Q)$.
2. $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$.
3. $\deg(\lambda P) = \begin{cases} \deg(P) & \text{si } \lambda \neq 0 \\ -\infty & \text{si } \lambda = 0 \end{cases}$.
4. $\deg(P \circ Q) = \deg(P) \times \deg(Q)$ si $Q \neq 0$.

Exemple 5 : A connaître.

L'anneau $\mathbb{K}[X]$ est intègre. Soit $(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$, montrer que $PQ = 0 \Rightarrow P = 0$ ou $Q = 0$.

Définition I.6

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathbb{K}_n[X]$ l'ensemble des polynômes de $\mathbb{K}[X]$ de degré inférieur ou égal à n .

.....

Proposition I.7

Soit $n \in \mathbb{N}$. L'ensemble $\mathbb{K}_n[X]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$.

1. L'ensemble $\mathbb{K}_n[X]$ est inclus dans $\mathbb{K}[X]$: $\mathbb{K}_n[X] \subseteq \mathbb{K}[X]$.
2. Le polynôme nul est dans $\mathbb{K}_n[X]$: $0 \in \mathbb{K}_n[X]$.
3. L'ensemble $\mathbb{K}_n[X]$ est stable par combinaison linéaire : $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}, \forall (P, Q) \in \mathbb{K}_n[X]$, on a

$$\lambda P + \mu Q \in \mathbb{K}_n[X].$$

Exemple 6 : Soient $n \in \mathbb{N}$ et $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

1. Pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$, on définit le scalaire $P(\alpha)$ par $P(\alpha) = \sum_{k=0}^n a_k \alpha^k$.
2. Pour toute fonction $f \in \mathcal{F}(\mathbb{K}, \mathbb{K})$, on peut définir la fonction $P(f)$ par $P(f) = \sum_{k=0}^n a_k f^k$, où $f^k = f \times f \times \dots \times f$ et $f^0 = \tilde{1} : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$.
3. Pour toute fonction $f \in \mathcal{F}(\mathbb{K}, \mathbb{K})$, on peut définir la fonction $P(f)$ par $P(f) = \sum_{k=0}^n a_k f^k$, où $f^k = f \circ f \circ \dots \circ f$ et $f^0 = \text{Id}$.
4. Pour tout $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, on définit la matrice $P(A)$ par $P(A) = \sum_{k=0}^n a_k A^k$, où $A^0 = I_p$.

Exemple 7 : Si $P = 1 + X^2 - 2X^3$. Pour $\alpha = 2$, calculer $P(\alpha)$. Pour $f : x \mapsto x + 1$, calculer $P(f)$. Pour $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, calculer $P(A)$.

Définition I.8

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$. On appelle **fonction polynomiale** associée à P la fonction

$$\tilde{P} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K} \\ x \mapsto P(x).$$

Exemple 8 : Si $P = 4 + 2X - X^3 + 12X^4 + X^9$, alors la fonction polynomiale associée à P est

II Dérivation

Définition II.1

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$. On appelle **polynôme dérivé** de P noté P' le polynôme défini par

$$P' = \dots\dots\dots$$

Remarque 9 :

- La définition ci-dessus est formelle et fonctionne pour tous les polynômes. De même qu'il est maladroit et même erroné de présenter X comme une variable, on ne justifie pas que P est dérivable, car on ne parle pas dans cette définition de taux d'accroissement.
- Bien entendu cette définition de dérivée pour les *polynôme* est cohérente avec la définition de la dérivée pour les *fonctions* polynomiales : si $\tilde{P} \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ est une fonction polynomiale, alors $\tilde{P}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ (au sens fonction) et de plus sa dérivée $(\tilde{P})'$ est la fonction polynomiale $(\tilde{P}')$ associée à P' (dérivée de P au sens polynôme).

Proposition II.2

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ deux polynômes et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ deux scalaires.

1. Si $\deg(P) \geq 1$, alors $\deg(P') = \deg(P) - 1$.
2. Le polynôme P est constant si et seulement si $P' = 0$.
3. (*Linéarité*). $(\lambda P + \mu Q)' = \lambda P' + \mu Q'$.
4. (*Produit*). $(PQ)' = P'Q + PQ'$.
5. (*Composition*). $(P \circ Q)' = Q'(P' \circ Q)$.

Proposition II.3

On définit par récurrence pour tout $r \in \mathbb{N}$, la dérivée r -ième de P par

$$P^{(0)} = P \quad \text{et} \quad P^{(r+1)} = (P^{(r)})'.$$

Exemple 10 : Pour tout $(n, r) \in \mathbb{N}^2$ exprimer $(X^n)^{(r)}$.

Proposition II.4

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ deux polynômes, $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ deux scalaires et n et $r \in \mathbb{N}$ deux entiers.

1. Si P est non nul de degré n et si $r \leq n$ alors $P^{(r)}$ est de degré $n - r$.
2. Si $r > n$, alors $P^{(r)} = 0$.
3. (*Linéarité*). $(\lambda P + \mu Q)^{(r)} = \lambda P^{(r)} + \mu Q^{(r)}$.
4. (*Formule de Leibniz*) $(PQ)^{(r)} = \sum_{k=0}^r \binom{r}{k} P^{(k)} Q^{(r-k)}$.

Proposition II.5 (Formule de Taylor pour les polynômes)

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ (P non nul), alors pour tout $h \in \mathbb{K}$,

$$P(X+h) = \dots\dots\dots$$

ou encore

$$P(X) = \dots\dots\dots$$

Remarque 11 : En particulier si $h = 0$ alors $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(0)}{k!} X^k$ et donc

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad a_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!}.$$

(la formule est facilement vérifiable pour $k > n = \deg(P)$ car alors $a_k = 0$ et $P^{(k)} = 0$)

III Division dans $\mathbb{K}[X]$

Définition III.1

Soit $(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$ deux polynômes. On dit que Q **divise** P ou P est un **multiple** de Q si et seulement s'il existe $R \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = QR$. On note alors $Q|P$.

Exemple 12 :

1. Le polynôme $(X-1)(X+2)$ divise $(X-1)^2(X+2)(X^2+1)$.
2. Tous les polynômes divisent 0 mais 0 ne divise que lui-même.
3. Le polynôme X divise $X^5 - 3X^3 + X$.
4. Le polynôme $X-1$ divise $X^n - 1$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ car $X^n - 1 = (X-1) \sum_{k=0}^{n-1} X^k$.

Remarque 13 : Soient $P, Q, R, U, V \in \mathbb{K}[X]$.

1. Si $Q|P$ et si $P \neq 0$ alors $\deg(Q) \leq \deg(P)$.
2. La divisibilité est réflexive $P|P$.
3. La divisibilité est transitive si $R|Q$ et si $Q|P$ alors $R|P$.
4. Si $U|P$ et si $V|Q$ alors $UV|PQ$.
5. Si $R|P$ et si $R|Q$ alors $R|UP + VQ$.

Attention, la divisibilité n'est ni anti-symétrique et encore moins symétrique.

Proposition III.2

Soient $(P, Q) \in \mathbb{K}[X]$. Les propositions suivantes sont équivalentes.

1. $Q|P$ et $P|Q$.
2. Il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $P = \lambda Q$

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2). Si $Q|P$ et $P|Q$, alors $\deg(Q) \leq \deg(P) \leq \deg(Q)$ et donc $\deg(P) = \deg(Q)$. On sait également qu'il existe $R \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = QR$ et donc $\deg(P) = \deg(Q) + \deg(R) = \deg(P) + \deg(R)$. Si $P = 0$ alors $P|Q$ implique $Q = 0$ et donc (2) est vrai. Supposons $P \neq 0$ i.e. $\deg(P) \in \mathbb{N}$. Alors $\deg(R) = 0$ c'est-à-dire R est constant et non nul, $R = \lambda \in \mathbb{K}^*$ et donc $P = \lambda Q$.

(2) $\Rightarrow$ (1) est évident. □

Théorème III.3 (Division euclidienne)

Soient $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$ avec $B \neq 0$. Il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que

$$\begin{aligned} A &= BQ + R, \\ \deg(R) &< \deg(B). \end{aligned}$$

Le polynôme R est appelé le reste et Q le quotient de la division euclidienne de A par B .

Remarque 14 : $B|A$ si et seulement si le reste de la division euclidienne de A par B est nul.

Exemple 15 : Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Calculer le reste de la division euclidienne de P par $X - \alpha$.

Algorithme de la division euclidienne.

Exemple 16 :

La division de $X^3 + X^2$ par $X - 1$ donne :



Exemple 17 : Calculer la division euclidienne de $X^3 + 2X^2 - X - 2$ par $X^2 + 1$.

Méthode de Horner.

Dans le cas où l'on divise P par un polynôme unitaire de degré 1 uniquement i.e. de la forme $X - \alpha$, la méthode ci-dessous permet d'obtenir les coefficients du quotient Q .

Soit $P = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0$. On calcule successivement les cases rouges du tableau ci-dessous :

	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\dots$	a_1	a_0
α	$b_{n-1} = a_n$	$b_{n-2} = \alpha b_{n-1} + a_{n-1}$	$b_{n-3} = \alpha b_{n-2} + a_{n-2}$	$\dots$	$b_0 = \alpha b_1 + a_1$	$r = \alpha b_0 + a_0$

Alors, les coefficients b_i sont ceux de $Q : Q = b_{n-1} X^{n-1} + b_{n-2} X^{n-2} + \dots + b_1 X + b_0$ et r le reste :

$$P = Q(X - \alpha) + r.$$

Notez qu'en évaluant en α , on obtient

$$r = P(\alpha).$$

La méthode de Horner, permet donc aussi de calculer $P(\alpha)$.

Exemple 18 : Soit $P = 3X^4 - 2X^3 + 6X^2 + 5X - 2$. Calculons $P(3)$ et le reste de la division euclidienne de P par $X - 3$ par la méthode de Horner. On a

					
.....					



Ainsi, on obtient $P(3) = \dots\dots\dots$ et $P = \dots\dots\dots$

Exemple 19 : Soit $P = 3X^4 - X^2 - 16X - 14$. Calculer $P(2)$ puis déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de P par $X - 2$.

Remarque 20 : Attention, la méthode de Horner (contrairement à la division euclidienne) ne fonctionne QUE lorsque le diviseur est de la forme $X - \alpha$.

IV Racine d'un polynôme

Définition IV.1

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. On dit α est **une racine** de P si et seulement si

Proposition IV.2

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Les propositions suivantes sont équivalentes.

1. α est une racine de P
2. Le polynôme $X - \alpha$ divise P .

Démonstration. D'après l'exemple 14, pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$, il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$, on a $P = Q(X - \alpha) + P(\alpha)$. Donc α est une racine si et seulement si $P(\alpha) = 0$ si et seulement si $P = Q(X - \alpha)$ si et seulement si $X - \alpha$ divise P . $\square$

Proposition IV.3

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$. Si $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ sont des racines **distinctes** de P alors $\prod_{k=1}^p (X - \alpha_k)$ divise P .

Corollaire IV.4

1. Tout polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ admet au plus n racines distinctes.
2. Tout polynôme non nul admet un nombre fini de racines.
3. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et A une partie infinie de $\mathbb{K}$. Alors

$$(\forall x \in A, P(x) = 0) \Rightarrow P = 0.$$

4. Soit $(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$ et A une partie infinie de $\mathbb{K}$. Alors

$$(\forall x \in A, P(x) = Q(x)) \Rightarrow P = Q.$$

Démonstration. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $P \in \mathbb{K}_n[X]$. Si P admet strictement plus de n racines, alors d'après la proposition précédente, il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1} \in \mathbb{K}$, $n+1$ scalaires distincts tels que $\prod_{k=1}^{n+1} (X - \alpha_k) \mid P$. Par conséquent, si $P \neq 0$, alors $n+1 = \deg\left(\prod_{k=1}^{n+1} (X - \alpha_k)\right) \leq \deg(P) = n$ ce qui est absurde. Donc $P = 0$. Nous avons démontré le premier point. Les autres points découlent directement de ce premier point. $\square$

Remarque 21 : Ce résultat est souvent utile pour montrer qu'un polynôme est nul en montrant qu'il est de degré n et possède au moins $n+1$ racines ou en montrant qu'il possède une infinité de racines.

Exemple 22 :

- Montrer que la fonction sinus n'est pas une fonction polynomiale.
- Montrer que l'exponentielle complexe n'est pas une fonction (complexe) polynomiale.

Définition IV.5

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$, $P \neq 0$ et $\alpha \in \mathbb{K}$, une racine de P . On appelle **ordre de multiplicité** de α l'entier $m \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$(X - \alpha)^m \mid P \quad \text{et} \quad (X - \alpha)^{m+1} \text{ ne divise pas } P$$

Une racine de multiplicité 1 est dite **simple** et une racine de multiplicité 2 est dite **double**.

Remarque 23 :

- Cette définition est cohérente. Posons $\mathcal{N} = \{p \in \mathbb{N}^* (X - \alpha)^p \mid P\}$. Si α est une racine on sait que $(X - \alpha) \mid P$ et donc $1 \in \mathcal{N}$. Donc $\mathcal{N} \neq \emptyset$. De plus, puisque $P \neq 0$, pour tout $p > \deg(P)$, on a par considération sur le degré que $(X - \alpha)^p$ qui ne divise pas P . Donc $\mathcal{N}$ est majorée par $\deg(P)$. Donc $\mathcal{N}$ est une partie non vide et majorée de $\mathbb{N}$ et admet une maximum qui est m .

- Le scalaire α est une racine de multiplicité $m \in \mathbb{N}$ de P si et seulement s'il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que

$$P = (X - \alpha)^m Q \quad \text{et} \quad Q(\alpha) \neq 0.$$

- $(X - \alpha)^m \mid P$ si et seulement si α est une racine de P de multiplicité d'au moins m .

Proposition IV.6

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, $P \neq 0$. Si $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ sont des racines distinctes de P de multiplicité $m_1, \dots, m_p$ respectivement alors

$$\prod_{k=1}^p (X - \alpha_k)^{m_k} = (X - \alpha_1)^{m_1} (X - \alpha_2)^{m_2} \times \dots \times (X - \alpha_p)^{m_p} \mid P.$$

Corollaire IV.7

Un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ possède au plus n racines comptées avec leur ordre de multiplicité.

Proposition IV.8

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$, $P \neq 0$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Les propositions suivantes sont équivalentes.

- α est une racine de P de multiplicité m .
- $P(\alpha) = P'(\alpha) = P''(\alpha) = \dots = P^{(m-1)}(\alpha) = 0$ et $P^{(m)}(\alpha) \neq 0$.

Exemple 24 : Soit $P = -2 + 5X - 2X^2 - 4X^3 + 4X^4 - X^5$. Vérifier que 1 est une racine de P et calculer son ordre de multiplicité.

Proposition IV.9

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme à **coefficients réels** et $\alpha \in \mathbb{C}$ une racine complexe de P .

Alors,

V Factorisation

Définition V.1

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On dit que P est un polynôme **irréductible** dans $\mathbb{K}[X]$ si et seulement si

- P est non constant : $\deg(P) \geq 1$.
- Les seuls diviseurs de P sont les polynômes constants (non nuls) et les polynômes λP avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$. Autrement dit

$$P = AB \quad \Rightarrow \quad (\deg(A) = 0 \quad \text{OU} \quad \deg(B) = 0).$$

Exemple 25 :

- Tous les polynômes de degré 1 sont irréductibles.
- Tous les polynômes de degré strictement plus grand que 1 possédant une racine ne sont pas irréductibles.
- La réciproque du point précédent est fautive : $(X^2 + 1)(X^2 + 2)$ n'a pas de racine réelle mais n'est pas irréductible.

Exemple 26 : Le polynôme $P = X^2 + 1$ est-il irréductible dans $\mathbb{C}[X]$? dans $\mathbb{R}[X]$?

Définition V.2

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On dit que P est un polynôme **scindé** dans $\mathbb{K}[X]$ si et seulement s'il est constant ou s'écrit comme un produit de polynôme de degré 1

Remarque 27 :

- Si P est un polynôme non constant, alors il existe $a_1, \dots, a_k$, non nuls et $b_1, \dots, b_k$ tels que

$$P = (a_1 X + b_1)(a_2 X + b_2) \cdots (a_k X + b_k) = a_1 a_2 \cdots a_k \left(X + \frac{b_1}{a_1}\right) \left(X + \frac{b_2}{a_2}\right) \cdots \left(X + \frac{b_k}{a_k}\right).$$

Posons $a = a_1 a_2 \dots a_k$ et $x_1 = -\frac{b_1}{a_1}, \dots, x_k = -\frac{b_k}{a_k}$. Alors

$$P = a (X - x_1) (X - x_2) \dots (X - x_k),$$

où les x_i sont les racines de P (éventuellement se confondant). En regroupant les facteurs identiques, on écrit

$$P = a (X - \alpha_1)^{m_1} \dots (X - \alpha_r)^{m_r},$$

où les α_i sont les racines de P de multiplicité m_i .

- Le fait que P soit scindé ou non dépend du corps $\mathbb{K}$. Le polynôme $X^2 + 1$ est scindé dans $\mathbb{C}[X]$ mais pas dans $\mathbb{R}[X]$.

Théorème V.3 (Théorème de d'Alembert-Gauss)

Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ admet une racine dans $\mathbb{C}$.

Corollaire V.4

- Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.
- Tous les polynômes de $\mathbb{C}[X]$ sont scindés.
- Tout polynôme de degré $n \in \mathbb{N}^*$ admet exactement n racines comptées avec leur multiplicité.

Théorème V.5 (Théorème de décomposition en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$)

Pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$ il existe $a, \alpha_1, \dots, \alpha_p \in \mathbb{C}$ et $m_1, \dots, m_p \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$P = a (X - \alpha_1)^{m_1} \dots (X - \alpha_p)^{m_p}.$$

Exemple 28 : Rappel, à connaître : Dans $\mathbb{C}[X]$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$X^n - 1 = \dots \dots \dots$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} X^k = 1 + X + \dots + X^{n-1} = \dots \dots \dots$$

Théorème V.6 (Théorème de décomposition en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$)

Pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$ il existe $a, \alpha_1, \dots, \alpha_p, \beta_1, \dots, \beta_q, \gamma_1, \dots, \gamma_q \in \mathbb{R}$ et $m_1, \dots, m_p, s_1, \dots, s_q \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$P = a (X - \alpha_1)^{m_1} \dots (X - \alpha_p)^{m_p} (X^2 + \beta_1 X + \gamma_1)^{s_1} \dots (X^2 + \beta_q X + \gamma_q)^{s_q},$$

avec pour tout $k \in \llbracket 1; q \rrbracket$, $\beta_k^2 - 4\gamma_k < 0$.

Démonstration. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Par le théorème V.5, il existe $a, \alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{C}$ et $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$P = a (X - \alpha_1)^{m_1} \dots (X - \alpha_r)^{m_r}.$$

Quitte à les réindexer, on suppose que $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ sont réels tandis que $\alpha_{p+1}, \dots, \alpha_r$ sont complexes (non réels). Puisque P est réelle, il est facile de vérifier que si ω est une racine de P alors $\bar{\omega}$ est aussi une racine de P . Donc pour tout $i \in \llbracket p+1; r \rrbracket$, $\bar{\alpha}_i \in \{\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \alpha_r\}$. Par conséquent, il existe $q (= (r - p)/2) \in \mathbb{N}$ et $\omega_1, \dots, \omega_q \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ tels que

$$\{\omega_1, \dots, \omega_q, \bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_q\} = \{\alpha_{p+1}, \dots, \alpha_r\}.$$

De plus si ω_i est une racine de multiplicité $s \in \mathbb{N}^*$, alors ω est une racine de $P, P', \dots, P^{(s-1)}$ mais pas de $P^{(s)}$. Donc par passage au conjugué, on en déduit également que $\bar{\omega}$ est une racine de $P, P', \dots, P^{(s-1)}$ mais pas de $P^{(s)}$. Autrement dit $\bar{\omega}$ est une racine de multiplicité s également. De par ces considérations, on peut écrire

$$P = a (X - \alpha_1)^{m_1} \dots (X - \alpha_p)^{m_p} (X - \omega_1)^{s_1} (X - \bar{\omega}_1)^{s_1} \dots (X - \omega_q)^{s_q} (X - \bar{\omega}_q)^{s_q}$$

$$= a (X - \alpha_1)^{m_1} \dots (X - \alpha_p)^{m_p} (X^2 - 2\operatorname{Re}(\omega_1)X + |\omega_1|^2)^{s_1} \dots (X^2 - 2\operatorname{Re}(\omega_q)X + |\omega_q|^2)^{s_q}.$$

On pose $\beta_i = -2\operatorname{Re}(\omega_i)$ et $\gamma_i = |\omega_i|^2$ qui sont des réels tels que $\beta_i^2 - 4\gamma_i = 4\operatorname{Re}(\omega)^2 - 4|\omega_i|^2 < 0$ car $\omega_i \notin \mathbb{R}$. On a alors bien

$$P = a(X - \alpha_1)^{m_1} \dots (X - \alpha_p)^{m_p} (X^2 + \beta_1 X + \gamma_1)^{s_1} \dots (X^2 + \beta_q X + \gamma_q)^{s_q}.$$

□

Proposition V.7

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont

1. Les polynômes de degré 1.
2. Les polynômes de degré 2 ayant un discriminant strictement négatif.

Exemple 29 : Calculer la décomposition dans $\mathbb{R}[X]$ des polynômes suivants.

1. $X^4 + 1$
2. $X^8 - 1$
3. $X^5 + 1$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme scindé de degré n . On note d'une part

$$P = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0$$

et d'autre part

$$P = a(X - x_1) \dots (X - x_n),$$

où des x_i sont éventuellement égaux entre eux. En développant, on obtient

$$P = a(X^n - \sigma_1 X^{n-1} + \sigma_2 X^{n-2} + \dots + (-1)^p \sigma_p X^{n-p} + \dots + (-1)^n \sigma_n).$$

où pour tout $p \in \llbracket 1; n \rrbracket$,

$$\sigma_p = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_p \leq n} x_{i_1} \dots x_{i_p}.$$

Ces formules permettent de relier les coefficients de P à ses racines. Notamment

$$\sigma_1 = x_1 + \dots + x_p = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \quad \text{et} \quad \sigma_n = x_1 x_2 \dots x_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}.$$

Proposition V.8

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme scindé de degré n . On note $a_0, \dots, a_n$ les coefficients de P et $x_1, \dots, x_n$ ses racines avec multiplicité. Alors

$$x_1 + \dots + x_p = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \quad \text{et} \quad x_1 x_2 \dots x_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}.$$

Exemple 30 : Déterminer les racines de $P = 3X^3 + 9X^2 - 12$.

Exemple 31 : Soient $P = X^2 + pX + q \in \mathbb{K}_3[X]$. On suppose P scindé dans $\mathbb{K}$ et on note x_1, x_2 et x_3 les racines de P . Exprimer $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ en fonction de p et q .

Théorème V.9 (Décomposition en éléments simples - rappel)

Soient $p \in \mathbb{N}^*$, $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p$ des réels ou des complexes **distincts**, $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme et

$$Q = (X - x_1)(X - x_2) \dots (X - x_p).$$

Alors il existe $E \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme et $(\alpha_1, \dots, \alpha_p) \in \mathbb{K}^p$ des réels ou complexes tels que

$$\frac{P(X)}{Q(X)} = \dots\dots\dots$$

Remarque 32 : La polynôme E (éventuellement nul) appelé la partie entière est le quotient dans la division euclidienne de P par Q : $P = EQ + R$ et donc $\frac{P}{Q} = E + \frac{R}{Q}$ avec $\deg(R) < \deg(Q)$.

Exemple 33 : Calculer la décomposition en éléments simples de $F = \frac{X^5 + X^4 + X^2 + X + 1}{X^3 - X}$.

Exemple 34 : Calculer dans $\mathbb{C}$ puis dans $\mathbb{R}$ la décomposition en éléments simples de $F = \frac{X^5}{(X^2+4)(X+1)}$

Exemple 35 : Calculer dans $\mathbb{C}$ puis dans $\mathbb{R}$ la décomposition en éléments simples de $F = \frac{1}{X^4+X^2+1}$

Exemple 36 : Décomposer en éléments simples $F = \frac{X^3+X+1}{(X-1)^3(X+1)}$.



Jean (Le Rond d')Alembert (Paris 1717 - Paris 1783) D'Alembert fut le fils illégitime d'un commissaire d'artillerie, le Chevalier Destouches-Canon et de la marquise de Tencin. Il fut abandonné le lendemain de sa naissance sur le parvis de l'église de Saint-Jean-le-Rond (d'où son patronyme). Son père au courant de cette abandon s'occupera de le faire placer dans une famille nourricière et lui assurera des études. Après de brillantes études de droit et de médecine chez les jésuites, D'Alembert se tourna vers sa passion des mathématiques et entra à l'Académie française. Très soucieux de reconnaissance, il tentait bien souvent de s'emparer des sujets d'autres mathématiciens comme Clairaut, Bézout, Euler pour les prendre de vitesse, mais la plupart du temps sans succès. Habitué des salons parisiens, il aimait et fournit dans les années 1740 ses meilleurs travaux scientifiques. A partir de 1745, il se joint au monde des Lumières et participe à la rédaction de l'Encyclopédie. Après sa rupture avec l'unique amour de sa vie, Julie De Lespinasse, il se retira meurtri dans un petit appartement près du Louvre mais continuera d'encourager de jeunes mathématiciens comme Lagrange et Laplace.

Ses apports majeurs concernent les nombres complexes, l'analyse et les probabilités. Il tenta de définir le logarithme et les fonctions puissances sur $\mathbb{C}$ et donna une preuve - presque complète - du théorème fondamental de l'algèbre. Gauss la complétera puis en donnera trois autres ! Opposé aux idées de Leibniz et Euler sur l'infiniment petit, il donnera une définition floue de la notion de limite. Il introduira également des équations aux dérivées partielles (étude des cordes vibrantes).

C'est l'histoire d'un petit problème de primaire qui, réforme après réforme, a su s'adapter intelligemment à son époque :

1960 : Un paysan vend un sac de pommes de terre pour 10F. Sa production lui coûte les $\frac{4}{5}$ de son prix de vente. Quel est son profit ?

1970 : un paysan échange un ensemble P de pommes de terre contre un ensemble M de pièces de monnaie. Le cardinal de l'ensemble M est égal à 10 et chaque élément de M vaut 1F. Dessine dix gros points représentant les éléments de M . L'ensemble C des coûts de productions est composé de deux gros points de moins que l'ensemble M . Représente C et donne le cardinal de l'ensemble des profits.

1980 : Un paysan vend un sac de pommes de terre pour 10F. Sa production lui coûte les $\frac{4}{5}$ de son prix de vente, c'est à dire 8F. Quel est son profit ?

1990 : Un paysan vend un sac de pommes de terre pour 10F. Ses coûts de production sont de 80% de son revenu. Sur ta calculatrice trace la représentation graphique de ses coûts de production en fonction de ses revenus. Lance le programme PMODETER pour déterminer le profit. Discute des résultats en groupe de 4 élèves et rédiger une analyse qui met en perspective cet exemple dans le monde économique actuel.

2000 : Un paysan vend un sac de pommes de terre pour 10F. Sa production lui coûte les 8F et son profit est de 2F. Souligne les mots « pommes de terre » et discutes-en avec tes camarades de classe.