

## TD1

### Logique et raisonnement

**Exercice 1** Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ . Ecrire avec des quantificateurs les phrases suivantes puis les nier.

1. La fonction  $f$  s'annule sur  $I$ .
2. La fonction  $f$  est la fonction nulle sur  $I$ .
3. La fonction  $f$  ne prend jamais deux fois la même valeur sur  $I$ .
4. La fonction  $f$  admet un minimum sur  $I$ .
5. La fonction  $f$  prend des valeurs arbitrairement grandes sur  $I$ .

**Exercice 2** Déterminer toutes les propositions l'on peut obtenir en permutant l'ordre des quantificateurs avec leur variable et préciser leur véracité.

$$\exists x \in \mathbb{R}^*, \forall y \in \mathbb{R}^*, \forall z \in \mathbb{R}^*, \quad z = xy.$$

**Exercice 3** Soient  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue et  $P, Q$  et  $R$  les assertions suivantes :

$$\begin{aligned} P : & \quad \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0, \\ Q : & \quad \exists x \in \mathbb{R}, f(x) = 0, \\ R : & \quad (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0) \text{ OU } (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) < 0). \end{aligned}$$

1. Énoncer les assertions  $P, Q$  et  $R$  en français.
2. Écrire les négations de  $P, Q$  et  $R$ .
3. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont exactes ?

$$\begin{array}{lll} 1. P \Rightarrow Q & 2. Q \Rightarrow P & 3. Q \Rightarrow R \\ 4. \text{non}(R) \Rightarrow Q & 5. \text{non}(Q) \Rightarrow \text{non}(P) & 6. \text{non}(P) \Rightarrow \text{non}(R) \end{array}$$

Lorsque l'affirmation est fautive, en donner un contre-exemple.

**Exercice 4** Démontrer que pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ,  $xy \leq \frac{x^2+y^2}{2}$ .

**Exercice 5** Démontrer que  $\frac{\ln(2)}{\ln(3)}$  est irrationnel.

**Exercice 6** Déterminer toutes les fonctions  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  impaires tel que  $f - \text{Id}_{\mathbb{R}}$  soit paire.

**Exercice 7** Démontrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

**Exercice 8** On considère la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par  $u_0 = 0, u_1 = 1$  et pour tout  $n \geq 0, u_{n+2} = u_{n+1} + 2u_n$ .

1. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}, u_n \in \mathbb{N}$ .
2. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N} \quad u_n = \frac{2^n - (-1)^n}{3}$ .

**Exercice 9** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $u_1 = 1$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_1 + \frac{u_2}{2} + \frac{u_3}{3} \dots + \frac{u_n}{n}$ . Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}, u_n \leq n$ .

### Pour aller plus loin

**Exercice 10**

1. Soit  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ . Mettre  $\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2$  sous forme canonique.
2. Démontrer que pour tout  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ ,

$$(\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2 = 0) \Rightarrow (\alpha = \beta = 0).$$

**Exercice 11** Soient  $a$  et  $b$  deux réels strictement positifs.

1. Démontrer que  $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$ .
2. En déduire que  $|\sqrt{a} - \sqrt{b}| \leq \sqrt{|a-b|}$ .

*On pourra faire une disjonction si  $a > b$  ou  $a \leq b$  et poser  $\alpha = a - b$  et  $\beta = b$ .*

**Exercice 12** Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Montrer que si  $n^2 - 1$  n'est pas divisible par 8 alors  $n$  est pair.

**Exercice 13** Montrer qu'il n'existe pas de polynôme  $P$  tel que  $\forall x \in \mathbb{R}, e^x = P(x)$ .

**Exercice 14** On considère la suite définie par  $u_0 = 0, u_1 = 0, u_2 = 1$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}, u_{n+3} = 3u_{n+2} - 3u_{n+1} + u_n$ . Démontrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}, u_n = n(n-1)$ .

**Exercice 15** Déterminer toutes les applications  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  telles que

$$\forall (n, m) \in \mathbb{N}^2, \quad f(n+m) = f(n) + f(m).$$

**Exercice 16** Déterminer toutes les applications  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x)f(y) - f(xy) = x + y.$$

**RAB**

**Exercice 17** Ecrire les propositions suivantes et leurs négations à l'aide de quantificateurs et dire lesquelles sont vraies.

1. Aucun entier n'est supérieur à tous les autres.
2. Il existe un entier multiple de tous les autres.
3. Tous les réels ne sont pas des quotients d'entiers.
4. Certains réels sont supérieurs à leur carré.
5. Etant donné trois réels, il y en a au moins deux de même signe.

**Exercice 18** Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  contenant 0 et  $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ . Énoncer en français les assertions suivantes et écrire avec des quantificateurs leurs négations.

1.  $\exists C \in \mathbb{R}, \forall x \in I, f(x) = C$ .
2.  $\forall x \in I, f(x) = 0 \Rightarrow x = 0$ .
3.  $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in I, f(x) = y$ .
4.  $\forall (x, y) \in I^2, x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$ .
5.  $\forall x \in I, f(x) > 0 \Rightarrow x \neq 0$ .

**Exercice 19** Dire si les assertions suivantes sont vraies ou fausses et écrire leurs négations.

1.  $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0$ .
2.  $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y > 0$ .
3.  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0$ .
4.  $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y^2 > x$ .

**Exercice 20** Soit  $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . Dans chacun des cas suivants dire si l'assertion est vraie ou fausse et la nier.

1.  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists N \in \mathbb{N}, n \leq N$ .
2.  $\exists n \in \mathbb{N}, \forall N \in \mathbb{N}, n \leq N$ .
3.  $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y = f(x)$ .
4.  $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y = f(x)$ .

**Exercice 21** Préciser la validité des énoncés suivants puis les nier.

1.  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, m$  divise  $n$ .
2.  $\exists m \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, m$  divise  $n$ .
3.  $\exists a \in \mathbb{R}^*, \forall \varepsilon > 0, |a| \leq \varepsilon$ .
4.  $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in \mathbb{R}^*, |a| \leq \varepsilon$ .
5.  $\forall M > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, 2^n > M$ .
6.  $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y < x$ .
7.  $\forall x \in \mathbb{R}, (x + 1 \neq 0 \text{ OU } x + 2 \neq 0)$ .

**Exercice 22** Démontrer que  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |x + y| = |x| + |y| \Leftrightarrow xy \geq 0$ .

**Exercice 23** Démontrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 - x + 1 \geq |x - 1|.$$

**Exercice 24** Soient  $a_1, \dots, a_9$  neuf entiers naturels tels que  $a_1 + \dots + a_9 = 90$ . Démontrer qu'il existe trois de ces nombres dont la somme est supérieure ou égale à 30.

**Exercice 25** Soit  $x$  un irrationnel positif. Démontrer que  $\sqrt{x}$  est irrationnel.

**Exercice 26** Montrer que lorsque qu'un réel peut s'écrire de la forme  $a + b\sqrt{2}$  avec  $(a, b) \in \mathbb{Z}$ , alors l'écriture est unique.

**Exercice 27** Déterminer tous les réels  $x$  strictement positifs vérifiant l'équation  $x^{(x^x)} = (x^x)^x$ .

**Exercice 28** Soient  $s$  et  $p$  deux réels. Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe deux réels dont la somme vaut  $s$  et le produit vaut  $p$ .

**Exercice 29** On cherche l'ensemble des isométries de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , c'est-à-dire l'ensemble des fonctions de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  vérifiant  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(y) - f(x)| = |y - x|$ .

1. **Analyse.** Soit  $f$  une isométrie de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . On définit l'application  $\delta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  par  $\forall x \in \mathbb{R}, \delta(x) = f(x) - f(0)$ .
  - (a) Montrer que pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2, \delta(y)\delta(x) = yx$ .
  - (b) En déduire la forme de  $f$ .
2. **Synthèse.** Conclure.

**Exercice 30** Soit  $q \in \mathbb{R}$  (ou  $\mathbb{C}$ ...), démontrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$1 + q + q^2 + q^3 + \dots + q^n = \begin{cases} \frac{1-q^{n+1}}{1-q} & \text{si } q \neq 1, \\ n + 1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

**Exercice 31** Démontrer les formules suivantes :

1.  $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ .
2.  $1 + 4 + 9 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ .
3.  $1 + 8 + 27 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ .

**Exercice 32** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  la suite définie par  $u_1 = 1$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = 1 + u_1 + \dots + u_n$ . Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*, u_n = 2^{n-1}$ .