

TD 19

Espaces Vectoriels de dimension finie

Exercice 1 Déterminer la dimension et une base des sous-espaces vectoriels de $E = \mathbb{R}_3[X]$ suivants

1. $F = \{ P \in E \mid P - \frac{1}{2}(X^2 + 1)P'' = 0 \}$
2. $G = \left\{ P \in E \mid \int_0^2 P(x) dx = 0, P(1) = 0 \right\}$

Exercice 2 On considère $F = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid x + y + z + t = 0 \right\}$ et $G = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid x + y = z + t \right\}$. Déterminer $\dim(F)$, $\dim(G)$, $\dim(F + G)$, $\dim(F \cap G)$.

Exercice 3 Dans $\mathbb{R}_3[X]$, on considère les polynômes :

$$P_1 = 1 + 2X + 3X^2 + 4X^3, \quad P_2 = 2 + 3X + 4X^2 + 5X^3, \quad P_3 = 1 + X + X^2 + X^3$$

$$P_4 = 1 - X + X^2 - X^3, \quad P_5 = 1 + 2X + X^2 + 2X^3$$

1. Déterminer le rang de la famille $(P_1, P_2, P_3, P_4, P_5)$.
2. On note $F = \text{Vect}(P_1, P_2, P_3, P_4, P_5)$ et $G = \text{Vect}(X^3)$. Montrer que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}_3[X]$.

Pour aller plus loin

Exercice 4 Soit $p \in \mathbb{N}^*$ et E l'ensemble des suites réelles p -périodiques, i.e. l'ensemble des suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+p} = u_n$$

Montrer que E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie et déterminer celle-ci. (on donnera à ce titre une base de E).

Exercice 5 Dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $E = \mathcal{F}] -1, 1[, \mathbb{R})$ on considère les fonctions définies pour tout $x \in] -1, 1[$ par

$$f_1(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}, \quad f_2(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}, \quad f_3(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{et} \quad f_4(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Quel est le rang de la famille (f_1, f_2, f_3, f_4) ?

Exercice 6 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathcal{C} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . On considère pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $\varepsilon_i = \sum_{k=1}^i e_k$.

1. Montrer que $\mathcal{C}' = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ est une base de E .
2. Soit $x \in E$. Exprimer les coordonnées de x dans $\mathcal{C}'$ en fonction de ses coordonnées dans $\mathcal{C}$.

Rab

Exercice 7 Soient G et F deux sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie $n \in \mathbb{N}$. Montrer que si $\dim F + \dim G > n$ alors $F \cap G \neq \{0_E\}$.

Exercice 8 Déterminer la dimension et une base des sous-espaces vectoriels de $E = \mathbb{R}_3[X]$ suivants

1. $F_1 = \{ P \in E \mid P(2) = 0 \}$
2. $F_2 = \{ P \in E \mid P(1) = P(2) = P(3) = 0 \}$
3. $F_3 = \left\{ P \in E \mid \int_0^2 P(x) dx = 0 \right\}$
4. $F_4 = \{ P \in E \mid P(1) = P'(1) = 0 \}$
5. $F_5 = \{ P \in E \mid P(X+1) = 2P(X) \}$

Exercice 9 Dans $\mathbb{R}^4$, on considère les vecteurs $u_1 = (1, 0, 1, 0)$, $u_2 = (0, 1, -1, 0)$, $u_3 = (1, 1, 1, 1)$, $u_4 = (0, 0, 1, 0)$ et $u_5 = (1, 1, 0, -1)$. On pose $F = \text{Vect}(u_1, u_2, u_3)$ et $G = \text{Vect}(u_4, u_5)$. Quelles sont les dimensions de G , F , $F + G$ et $F \cap G$?

Exercice 10 Soit E l'ensemble des fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles qu'il existe $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ pour lesquels :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (ax^2 + bx + c) \cos(x)$$

1. Montrer que E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
2. Déterminer une base et la dimension de E .

Exercice 11 Déterminer le rang des familles suivantes définies dans $\mathbb{R}^4$ par :

1. $u_1 = (1, 1, 1, 1)$, $u_2 = (1, -1, 1, -1)$ et $u_3 = (1, 0, 1, 1)$.
2. $u_1 = (1, 1, 0, 1)$, $u_2 = (1, -1, 1, 0)$, $u_3 = (2, 0, 1, 1)$ et $u_4 = (0, 2, -1, 1)$.